

вательми щетинками; на голеняхъ замѣтны такого-же цвѣта короткіе шипики.

По своему очень маленькому тулowiщу, напоминающему по формѣ муравья, массивнымъ усикамъ, очень короткимъ надкрыльямъ и формѣ переднеспинки съ высокимъ ребромъ въ задней половинѣ, рѣзко отличается отъ всѣхъ извѣстныхъ видовъ этого рода.

Orthotylus salicis n. sp.

Ganz gleichfarbig grün, oben abstehend lang weisslich behaart. Kopf etwas breiter als lang; Fühlerwurzelglied etwas kürzer als der Kopf, Glied 2. drei oder $3\frac{1}{2}$ mal so lang als 1.; Schnabel an das Ende der Mittelbrust reichend, gelblichgrün, am Ende schwärzlich. Halbdecken doppelt länger als Abdomen, Membran bleich rauchbraun, Zellrippen bleich grünlich. Beine grün, Schienbeinende rostgelblich, fein weisslich bedornt, Klauenglied braun. — Long. $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{1}{2}$ mm.

♂. Fühler schwärzlich, Wurzelglied schwarz, am Ende weisslich, Glied 2. dick, walzig, am Grunde bisweilen bräunlich.

♀. Fühler bleich gelblichgrün, Glied 3. und 4. bräunlich, Wurzelglied am Grunde schwarz, unterseits mit schwarzem Strich; Glied 2. sehr dünn, am Ende allmälig und kaum merklich verdickt.

Тулowiще, надкрылья и ноги одноцвѣтныя, блѣдно-зеленыя, сверху съ длинными стоячими бѣловатыми волосками. Голова нѣсколько болѣе развита въ ширину, съ сильнымъ затылочнымъ ребромъ, у сухихъ экземпляровъ съ желтоватымъ оттѣнкомъ; первый суставъ усиковъ нѣсколько короче головы; второй въ 3 — $3\frac{1}{2}$ раза его длиниѣ. Хоботокъ достигаетъ до средней пары ногъ, желтовато-зеленый, на концѣ черноватый. Надкрылья почти вдвое длиннѣе брюшка, одноцвѣтныя, перепонка дымчатая, призирающая, съ болѣе темнымъ ободкомъ по вѣшнимъ краямъ, ребра перепонки блѣдно-зеленоватыя (у сухихъ экземпляровъ почти безцвѣтныя); клѣтки ея безъ пятенъ. Тулowiще снизу зе-