

laufend, leicht längsgekielt, die Vorderseitenränder leicht gerundet, Ende winkelig; Hinterrand fast abgestürzt. Stirn schmal, verlängert, hinten verbreitert, Seitenränder allmählig erhöht, blattförmig, spitzig. Scheitel etwa zwei drittelmal länger als das Pronotum. Augen klein, mit dem Pronotum fast zusammenstoßend; Nebenaugen nicht bedeutend. Fühlergrund ausgehöhlt, Pronotum hinten erhöht, gerundet und verbreitert, Hinterrand buchtig. Apikaldrittel der Decken netzartig; Clavus mit zwei starken Nerven. Die ganze Oberfläche stark und klein punktiert.

A. pulcherrimum sp. n.

Bleich gelblich, Kopf, Pronotum und Schildchen scharlachrot marmoriert; unten bleich gelblich, Beine scharlachrot marmoriert. Deckennerven abwechselnd bleich gelb und scharlachrot gestreift. Decken bis zum Ende reichend.

♀. Letztes Abdominalsegment in der Mitte tief ausgebuchtet, einen Teil des Ovipositors aussetzend. Scheide fast fünfmal so lang (von der Seite gesehen) als das letzte Abdominalsegment.

Länge 12 mm. Hab.: Bouake, Hinterland der Elfenbeinküste.

Hecalus Stål.

Hecalus Af:elii (Stål) Afrika: Bouake, Hinterland der Elfenbeinküste.

Fam. **Chermidae** (= *Psyllidae*).

Psyllia n. n. typ. *pyri* L. = *Psylla* auct. nec typ. (= *Chermes* L.)

Fam. **Cimicidae**.

Stictonotus n. n. = || *Stictocoris* Kirkaldy 1904 = || *Stictonotus* Stål 1870.

NB. »*Stictocoris* Thomson 1869 Opusc. Ent. S. 51« ist bei »Waterhouse« oder »Scudder« nicht zu finden.

Fam. **Miridae**.

Lopistus n. n. = *Lopus* Spinola (nec Hahn).

Der echte *Lopus* Hahn (1833 Wanz. Ins. I. S. 143 t. *hieracei* Fig. 73 = *Thunbergii* Fallén) ist mit *Hoplomachus* Fieber synonym. *Lopus* wurde nicht von Hahn (1831) beschrieben.

Reuteroscopus n. n. = || *Episcopus* Reuter 1875.

Pseudoloxops n. n. = || *Loxops* Fieber 1858. (Type *coccinatus* n. n. = || *coccineus* Mey.).