

(In honorem Dⁱ. L. R. Meyer, Hemipterolegi Helvetiae, qui Capsinorum monographiam edidit, denominata.)

Nigra; supra viridi-flava vel sulphurea et nigro-picta.
Caput nigrum nitidum, lineola tenuissima longitudinali lutea, pronotum antice in collum coaretatum, capite angustius, impressionibus semilunaribus, postice vix dimidio latius, sulphureum, vittis duabus longitudinalibus nigris, conicis, quarum basis usque ad marginem posticum tendit, apex autem coarctatus iterumque in maculam orbicularis dilatatus marginem anticum non attingit; episternum sulphureum, maculis duabus nigris; scutellum sulphureum, basi nigrum; hemelytra cum appendice sulphurea, clavo, maculaque in medio corii triangulare nigris, triangulo apice acuto antrorsum verso; membra nigro-fusca; antennae pedesque rufo-fusci aut nigris; venter niger, segmentis nonnumquam subtilissime luteo marginatis.

Long: $3\frac{3}{4}$ lin.

Lat: $1\frac{1}{3}$ lin.

Formosissima Capsinorum species habitat in Umbelliferis prope pagum Tschaikaent ad fluvium Kjuraktschai territorii Airum provinciae Karabagh Transcaucasiae et in pratis subalpinis montium ejusdem territorii Kaepes et Muroff - Dagh.

* * *Capite lineolis supraorbitalibus luteis, pronoto aequo longo ac lato.*

Spec. 80. *Sexguttatus*. Fabr. E. S. IV. 174. 139.

» » S. R. 237. 172.

» Fall. M. C. S. 43.

» H. S. 86. 20.

» Herrich-Schaeff. N. E. I. 48 et 87.