

rugineo, *pedibus* aut nigris, aut fuscis aut ferrugineis, *femoribus* apice annulis duobus piceis.

Long: $2\frac{2}{3}$ lin.

Lat: $1\frac{1}{5}$ lin.

Habitat in Caucasi et Iberiae pratis herbidis.

** *Hemielytris discoloribus*.

Spec. 114. *Cinctus*. m.

Vide: Tab. XI. fig. 29.

Ater, profunde punctatus, subnitidus; *capite*, *thorace*, *hemielytrorum* margine lato externo usque ad apicem appendicis, *antennarum* articulo primo, *coxis pedibusque* ferrugineis; *femoribus* absque annulis.

Long: $2\frac{1}{2}$ lin.

Lat: $1\frac{2}{3}$ lin.

Habitat in locis herbidis provinciae trans Caucasum sitae Elisabethopol.

d. *Pronotum hemielytraque convexa*, *impressionem nulla*.

α. *Femora simplicia*.

Genus: BRYOCORIS. Fall. H.

(Α βρύον, muscus et νόσος.) *Orthonotus*. Westwood. Curt. Cat. (ab ὀρθός, rectus et νότος, dorsum.) *Halticus*. Burm. *Anthocoris*. Zett. *Poecilosoma*. Steph. *Capsus*. Fabr. Fall. M. Meyer. *Lygaeus*. Wolff.

Character: *Antennae* filiformes, apice capillares. *Corpus* minutum; ovatum, convexum. *Hemielytra* coleoptrata, convexa, *membranae* rudimento aut nullo. *Habitant* in muscis. *Differentia sexus*: *Femina* rima brevi in segmento abdominis apicali, *mas* segmento eodem integro dignoscitur.

+ *Scutello nigro*.