

Verzeichnis der Arten.

Pithanus Fieb.**P. Maerkeli** H. S.

Sierra Nevada, zwischen 1500 und 2000 m Höhe, 23.7 — 2 St.; Algeciras, auf Strandwiesen SW von der Stadt, 15.4 — 1 St.; 18.7 — 1 St. — Alle gefundenen Stücke sind brachypter.

Miridius Fieb.**M. pallidus** Horv.

Villalba pr Madrid, 28.3 — 2 St.

Phytocoris Fall.**P. tiliae** F.

Malaga, 29.7 — 2 St.

P. longipennis Fl.

Malaga, 29.7 — 2 St.

P. populi L.

Malaga, 29.7 — 2 St.

P. femoralis Fieb.

Sierra de Cordoba, auf Mackien, 10—11.4 — 3 St.; Algeciras, auf *Erica*-Heiden in den Gebirgen beim Dorfe Cobre, 18.4 — 2 St.

P. exoletus Costa.

Sierra Nevada, auf Kraut- und Grasvegetation auf 1500 m Höhe in der Nähe eines Franziskanerklosters, 23.7 — 3 St.; Algeciras, W von der Stadt, 18.7 — 1 St.

P. ulmi L.

Malaga, 29.7 — 1 St.

P. miridioides Leth.

Sierra Nevada, auf Kraut- und Grasvegetation auf 1500 m Höhe, in der Nähe eines Franziskanerklosters, 23.7 — 3 St.

P. nevadensis n. sp.

Körper verhältnismässig klein, länglich, parallelseitig. Flügeldecken unbestimmt graubraun gefärbt mit etwas dunkleren beschränkten Zeichnungen und anliegender weisslicher Behaarung.

Kopf glänzend, am Hinterrande so breit wie in der Mediane lang, rostbraun, Clypeus und ein kleiner Fleck am Hinterrande des Scheitels weiss. Augen schwarz. 1. Antennenglied etwas verdickt, an der Basis und an der Spitze schmal, dunkelbraun, im mittleren Teile braun mit schwarzen, nach vorn gerichteten kurzen Haaren besetzt, fast so lang wie das Pronotum am Hinterrande breit. 2.—4. Glied ganz hellgelbbraun,