

**Hypomimus** n. gen.

Die Beschreibung ist auf ein langgeflügeltes Männchen gegründet. Kurzgeflügelte Exemplare (die meisten Weibchen?) wahrscheinlich ameisenähnlich.

Körper rötlichbraun. Kopf schwach geneigt. Scheitel ungerandet, mit scharfer Hinterkante. Augen ziemlich gross, Innenränder auf dem Scheitel parallel, auf der Stirn divergierend. Clypeus gegen die Stirn deutlich abgegrenzt. Alle Antennenglieder etwa gleich dick, 2. Glied gegen die Spitze sehr schwach verdickt, etwa so lang wie das 3. und 4. zusammen.

Pronotum (bei langgeflügelten Exemplaren) stark nach hinten verbreitert, mit geraden Seitenrändern, im hinteren Teil gewölbt. Schildchen im hinteren Teil eine konische Beule bildend. Schenkel und Schiene rund. 1. Glied der Hintertarsen kürzer als 2., 3. länger als die anderen. Flügeldecken länger als der Hinterleib, mit einer wellenförmigen Querbinde über dem Basalteil des Corium und der Mitte des Clavus.

Die neue Gattung gehört wie die unten beschriebene Gattung *Formicocoris* zu der Gruppe *Pilophoraria* Reut. Ihrem allgemeinen Aussehen nach ist sie der




Fig. 6. *Hypomimus albosellatus* n. sp.