

Orthotylus Fieb.***O. aceris* n. sp.**

Langgestreckt oval oder parallelseitig. Oberseite mit feinen gekrümmten Härchen besetzt.

Augen gelbgrau, Scheitel undeutlich gerandet. Kopf wenig länger als 1. Antennenglied. Beim ♀ ist das 1. Glied so lang wie der Scheitel breit, beim ♂ etwas kürzer. 2. Glied $\frac{1}{3}$ länger als 3. und 4. zusammengenommen. Antennen mit sowohl dunkeln wie weisslichen Haaren besetzt. Rostrum über die Spitze der Hintertarsen reichend.

Pronotum mit fast geraden Seiten- und Hinterrändern, am Vorderrande halb so breit wie am Hinterrande, so lang wie der Kopf. Die Buckel auf dem Vordertheil des Pronotum deutlich hervortretend.

Flügeldecken beim ♂ fast parallelseitig, beim ♀ langgestreckt oval. Membran gelb, fast durchsichtig, wenig rauchfarbig.

Beine gelb, 2. und 3. Glied der Hintertarsen gleich lang, Spitze des letztgenannten sowie Klauen angedunkelt. Hinterschiene zwischen 5 und 6 mal so lang als die Hintertarsen.

Länge: 4 mm; Breite: 1,5 mm.

Holotype (N:o 7728) im Zoologischen Museum der Universität Helsingfors, *Paratypen* ebenda sowie in meiner Sammlung.




Fig. 9. *Orthotylus aceris* n. sp. A Hinterleibspitze des ♂, von unten. — B Dieselbe von rechts. — C Dieselbe von links. — r rechter, l linker Griffel.