

côté, plus ou moins rapprochées, laissant sur l'espace médian une bande de la couleur foncière jaunâtre.

Partie postérieure du pronotum prenant graduellement une teinte olivâtre qui paraît due à une très fine ponctuation noirâtre sur le fond jaune, et plus dense vers le bord postérieur.

Écusson olivâtre, comme boursoufflé avec une ligne médiane longitudinale plus pâle; cette ligne pâle ne s'étend pas en arrière plus loin que le milieu de l'écusson; la partie antérieure de l'écusson, habituellement recouverte par le pronotum, est d'un jaune d'ocre, séparée latéralement du disque de l'écusson par un sillon noir interrompu sur le passage de la ligne médiane longitudinale pâle.

Élytres olivâtres avec les nervures rembrunies, à pubescence très courte et rare, à peine visible. Membrane enfumée, nervures noires.

Fémurs et tibias jaunâtres avec quelques points ou taches inégales brunes sur les fémurs; tarsi rembrunies, surtout sur leur extrémité qui est presque noire.

Long., 4 1/2-5 mill.

Algérie : Oran (L. Moisson).

La taille plus forte de cet insecte, sa teinte plus claire, l'absence de pubescence argentée, empêcheront facilement de le confondre avec *notaticeps* Reut.

Nasocoris platycranoïdes.

D'un vert tendre sur tout le dessous du corps et le devant du pronotum; dessus de la tête, pieds et élytres plus jaunâtres; partie postérieure du pronotum et écusson d'un rouge brun; cette dernière teinte s'étend quelquefois en dessous de la partie postérieure du pronotum sur les épipleures pro et mésothoraciques.

Premier article des antennes renflé, cylindro-conique, tronqué à son extrémité, vert comme le corps ou quelquefois ocracé, couvert d'une pubescence brune soyeuse très dense; les autres articles grêles, le second deux fois et demie plus long que le premier et égal au troisième.

Sommet du clypeus et dessous de la tête, surtout près de sa jonction avec le prothorax, recouverts d'une longue pubescence argentée. On voit aussi, sans doute quand les exemplaires examinés sont plus frais, quelques-uns de ces longs poils soyeux blancs sur le pronotum et l'écusson; mais sur les élytres, les poils sont noirs ou d'un brun foncé, très clairsemés.