

M. Nietner l'a prise communément dans les plantations de café, où elle nuit considérablement à la plante.

Edessides.

Aspangopus Janus F.
Tesserotoma papillosa Drury.
Cyclolepta sicifolia Hope.

Phyllocéphalides.

Phyllocephala aegyptiaca Lef.

Mictides.

Mictis castanea Dall.
— valida Dall.
— punctum Hope.
Crinocerus ponderosus Walk.

Anisoscélides.

Leptoscelis ventralis Dall.
— turpis Walk.
— marginalis Walk.
Serinetha taprobonensis Dall.
— abdominalis F.

Alydides.

Alydus linearis F.

Stenocéphalides.

Leptocorisa chinensis Dall.

Coréides.

Rhopalus interruptus Walk.

Corysus semicruciatu Motsch.

Subelongatus, parallelus, supra depressus, diluto sordido testacea, ferrugineo variegato et punctato, hemielytris basi et apice infuscatis, pedibus rufo-testaceis, subfusco annulatis, capite triangulari, fronte longitudinaliter impresso, oculis prominulis rufo-ferrugineis; thorace trapezoidale, antice paulo sinuato-dilatato, sparsim ferrugineo punctato, linea media maculisque duabus utrinque distincto subalbidis, scutello ferrugineo, fusco punctato, medio linea semicruciatu albida; hemelytris subinfumato-hyalinis, versus basin subfasciato infuscatis, membranae apice nervisque fusco-piceis; corpore subtus rufo-ferrugineo, diluto testaceo variegato.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Les antennes manquent, peut-être un *Heterogaster*.

Corysus brevicollis Motsch.

Precedente valde affinis, sed thorace brevioris unicolore, subferrugineo, fusco punctato, hemelytris membrana basi maculaque medio rufo-testaceis, apice punctoque laterali utrinque nigro-piceis, macula apicali medio paulo translucida; corpore subtus rufo-testaceus; oculis prominulis, nigro-fuscis; capite rufo-ferrugineo, antice deflexo, nitido, apice longitudinaliter toruloso-elevato, elevatione subalbido-pallido; antennis pedibusque subalbido-testaceis, diluto fusco annulatis.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

*Lygaeidae.***Heterogaster ceylanicus** Motsch.

Figura et color Het. punctipennis H. Sch. *valde affinis sed duplo minor; punctatus, nigro-fuscus, capite thoraceque sordido testaceo variegatis, hemelytris membrana subalbida, nervis pedibusque subtestaceis, nigro-punctatis, margine interiori maculis elongatis nigris tribus vel quatuor, exteriori angustissime nigro-piceo.*

Long. $\frac{1}{2}$ — $\frac{2}{3}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ — $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas, ainsi que des environs de Colombo.

Une espèce voisine, un peu plus grande (*H. oculus* m.) d'Algérie, se distingue par ses yeux excessivement saillants, placés sur des tubes latéraux.

Rhyparochromus brevis Motsch.

Rh. sylvatici affinis, sed duplo minor, praesertim brevior; opacus, punctatus, sparsim ciliatus, niger, hemielytris margine, vitta basali pedibusque ferrugineis, membrana lateraliter in medio macula delatiora, capite triangulari, oculis prominulis, rufo-ferrugineis, antennis corpore paulo brevioribus, articulis 1 et 2 basi, 4-0 apice rufescentibus, 3-0 quarto breviori; thorace transverso; femoribus simplicibus, anticis non incrassatis.

Long. 1 l. — lat. . $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas

Rhyparochromus fusconervosus Motsch.

Figura Rh. brunnei Sahlb., sed duplo minor, postice angustior; elongato - subovatus, punctatus, nitidus, rufotestaceus, hemelytris subalbidis, his nervis, macula postica laterali apiceque fusco-piceis, oculis subprominulis, nigris; thorace capitis latitudine, subtransverso-trapezoidali, sparsim punctato, nitido, postice dilatato, transversim impresso; scutello triangulari, profundius punctato, apice infuscato; hemelytris thoracis latitudine, subparallelis, postice attenuato-rotundatis, his nervis apiceque punctatis; femoribus anticis incrassatis.

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des environs de Colombo.

Rhyparochromus testaceipes Walk.**Plociomerus punctulatus Motsch.**

Pl. Luchii affinis, sed paulo brevior, membrana sordido-subalbida, nigro punctulata, pedibus dilutis, nigro annulatis; elongato-subovatus, subnitidus, cinereo-pilosus, niger, thorace rufescente - ferrugineo, antennis pedibusque diluto testaceis, nigro annulatis, membrana subalbida, punctis numerosis, nervis maculisque lateralis tribus nigris; capite triangulari, oculis globosis, nigro - fuscis; thorace conico, medio transversim coarctato, antice subconvexo rotundato, postice dilatato, sparsim nigro-punctato, vittis paulo deficientibus sex fuscis, interstitiis postice subalbidis; scutello inaequale opaco, nigro, medio maculis duabus rufescentibus; alis subalbidis, nigro-fusco variegatis.

Long. 2 l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des environs de Colombo, mais aussi en Egypte où je l'ai pris sous les chardons desséchés.

A Batavia on rencontre deux autres espèces du même genre, très-voisines du *Pl. Luchsii*, et dont l'une présente sur les hémélytres toute la marge latérale jusqu'à la tache apicale blanche et les cuisses plus ou moins noirâtres, tandis que chez l'autre toute la membrane est claire à l'exception seulement de la marge intérieure qui reste d'un noir foncé, avec les antennes et les cuisses postérieures d'un testacé roussâtre unicolore. La première, je l'ai nommée *Pl. javanus*, et la seconde *Pl. oblique-fasciatus*.

Plociomerus flavipes Motsch.

Precedenti affinis, sed duplo minor, postice angustior, supra magis rufescens; elongato-subovatus, medio parallelus opacus, fuscus, hemelytris sordido-testaceis, nigropunctulatis, medio postice subinfuscatis, corii membranaeque marginis exterioribus subalbido-testaceis, thorace abdomineque rufescente-fuscis, pedibus subrufo-testaceis; capite triangulari, nitido, subtilissime punctulato, antice subbimpresso, interstitio paulo elevato, oculis rotundatis, convexis, vix prominulis, granulosis, cinereis, ocellis duabus in vertice distinctis, subtestaceis; thorace ad basin fere capituli latitudine, impunctato, convexo, pilis brevissimis cinereis adperso, postice dilatato, profundo transversim impresso, lateribus arcuatis, angulis posticis subrotundatis; scutello triangulari, sparsim punctato, nigro-fusco, lateraliter ditubiori; hemelytris thoracis fere latitudine, parallelis, postice attenuato-rotundatis, nervis vix distinctis; alis subinfuscatis; femoribus anticis incrassatis, acuto bidentatis.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Plocimerus geniculatus Motsch.

Figura Pl. flavipedi sed dimidio minor; elongatus, subparallelus, opacus, crebre punctatus rufescente-fuscus, hemelytris sordido-albidis, fusco punctatis et nervosis, membrana ad marginem utrinque maculis vel punctis nigro-fuscis tribus, thorace postice rufescente, antennarum articulis duabus mediis pedibusque subalbido-pallidis, femoribus medio tibiatarumque apice nigro-piceis, capite triangulari, punctulato, oculis prominulis, ocellis rufescentibus, antennis thorace longioribus, articulo 1-o brevi nigro, 2-do triplo longiori, 3-o paulo breviori, 4-o elongato-subovato, tertio vix longiori, nigro; thorace subconvexo, trapezoidali, medio transversim impresso, antice leviter postice profundo punctato; scutello triangulari, profundius punctato, postice subcarinato; hemelytres thoracis fere latitudine, apice fusco variegatis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Une espèce très-voisine de la Havane se distingue principalement par les angles postérieurs de la membrane qui sont largement noirs; je l'ai nommée *Pl. ustulatus*.

Plociomerus bispinus Motsch.

Angustatus, elongatus, medio suparallelus, opacus, fusco-punctatus, nigro-ferrugineus, hemelytris subalbido-testaceis, rufescente nebulosis, nervis punctisque ferrugineis, antennarum articulis 2 et 3 pedibusque diluto testaceis, apice infuscatis, femoribus ferrugineo punctatis; capite elongato-conica, breviter sparsim pilosa, ocellis distinctis, ferrugineis, oculis globosis, nigro-fuscis, antennis corporis fere

longitudine, articulo 1-o breviori, 2-d fere triplo, 3-o solum duplo, 4-o primo $\frac{1}{2}$ longioribus; thorace conico, longitudine non latiore, antice convexo-rotundato, medio transversim coarctato, postice dilatato, punctato, lateribus postice utrinque spino acuto armatis; scutello elongato-triangulari, punctato, medio linea subalbida, antice oblitterata; hemelytris thorace capiteque conjunctis duplo longioribus; femoribus anticis incrassatis, apice subtus tridentatis, dente medio longissimo.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Macropes spinimanus Motsch. Et. ent. 1859. p. 108.
 $2\frac{1}{2}$ l. — Tab. II, fig. 19.

— *dentipes* Motsch. Et. ent. 1859. p. 108. $2\frac{1}{4}$ l. +

Stenogaster? lugubris Motsch. Et. ent. 1859. p. 108.
 $1\frac{3}{5}$ l. +

Lygaeus discifer Walk.

— *figuratus* Walk.

— *lutescens* Walk.

Capsides.

Capsus albipes Motsch.

Figura subdilatata C. tripustulati, sed quadruplo minor; niger, capite rufo, antennis, alarum lateribus pedibusque albidis; capite triangulare, nitido, fronte foveolato, clypei apice oculisque nigro-fuscis; thorace transverso-trapezoidale subconvexo, fortiter punctato; scutello triangulari, punctato-rugoso, postice elevato, nitido; hemelytris medio pau-

lo dilatatis, postice attenuatis, membrana unicolora, opaca, antice vix distincto punctata; corpore subtus nigro.

Long. $\frac{3}{4}$ — $\frac{4}{5}$ l. — lat. hemielytr. $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Deraeocoris rubrovulneratus Motsch.

Figura elongato-ovata Ph. fulvomaculati Debeer, sed minor; punctatus, ater, thorace nitido, hoc angulis posticis, scutelli apice, axillis geniculisque rufo-testaceis, membranis margine interiori postice vulnerato, rubro, tibiis antice subalbidis; capite triangulari, glabro, nitido, fronte inter oculos maculis duabus rufis vel testaceis, oculis transversis, prominulis, fusco-cinereis; thorace transverso-trapezoidale, nitido, fortiter punctato, subconvexo; scutello triangulari, punctato-rugoso, subnitido; hemelytris basi sparsim punctatis, elongatis, medio vix dilatatis, membrana postice sinuato truncata, lateraliter incisa, apice angulatim producta.

Long. $1\frac{1}{2}$ —2 l. — lat. $\frac{2}{3}$ — $\frac{2}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Deraeocoris viridanus Motsch.

Figura Der. pratensi et Der. icteocephali, sed paulo minor, oblongus, punctato-rugulosus, nitidus, melinus, capite, antennarum basi, corpore subtus pedibusque magis testaceis, oculis oblongis, prominulis, nigris, antennarum rostelloque apicis unguiculisque infuscatis; capite minuto, triangulari, vertice inter oculos transversim impresso, nitido, impunctato, antennis corporis fere longitudine, valde seta-

ceis, articulo 1 elongato, crasso, 2-do angustiori et triplo, 3-o duplo, 4-o solum $1\frac{1}{2}$ longiori; thorace transverso-trapezoidale, subconvexo, sparsim punctato, transversim ruguloso, ad basin arcuato-ampliato, angulis posticis subrotundatis; scutello triangulari transversim striguloso; hemelytris vix profundo punctatis, appendice indistincto, membrana absque cellulis, basi vena laterali instructa; corpore subtus subopacus, impunctatus; pedibus longiusculis, gracilibus, tibiis parce setulosis.

Long. 2 l. — lat. $\frac{3}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Deraeocoris piceoniger Motsch.

Figura Der. mutabilis, sed duplo minor, color obscurior; elongato-ovatus, nitidus, piceo-niger, rostellis, femoribus antennisque rufescentibus, his basi nigro, tibiis tarsisque dilute testaceis; capite magno, triangulato, impunctato, postice submarginato, fronte inaequale, oculis ovatis, convexis, distincto granulosis, antennarum articulo 1-o capite duplo brevior, 2-do triplo longiori, valido; thorace valde transverso, trapezoidale, vix convexo, impunctato, postice paulo deflexo, antice capite angustiore, angulis posticis vix rotundatis; mesonoto valde transverso, arcuato, scutello triangulato, impunctato, antice paulo deflecto, hemelytris thoracis latitudine, impunctatis, subparallellis, appendicibus subdistinctis, vena laterali parallela instructa; pedibus validis, tibiis parce setosis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Leptomerocoris alboviridescens Motsch.

Elongatus, fere parallelus, depressus, nitidus, albido puberulus, albido-subviridescens, capite, thorace scutelloque dilutioribus, oculis mediocris, valde prominulis, nitidis, nigro-piceis, antennarum articulo 2-do apice rubro; capite triangulari, laevi, vertice subconcavo, postice transversim impresso; thorace subconvexo, trapezoidali, antice glabro, capite angustiore, postice crebre punctato, dilatato, basi medio sinuato, angulis posticis vix rotundatis, lateribus concavo-subarcuatis, mesonoto occulto; scutello triangulare, impunctato, medio impresso; hemelytris thoracis latitudine, elongatis, postice rotundato subattenuatis, fere hyalinis, puberulis, vena laterali parallela, appendices indistinctis; pedibus elongatis, tenuis, subsordido variegatis, tibiis nudis.

Long. $1\frac{4}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{3}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Leptomerocoris? pistacinus Motsch.

Elongato-subovatus, depressus, opacus, dilute pistaceus, maculis duabus in medio thoracis, quinque hemelytrorum longitudinaliter positis, quatuor in corio, una communi ad apicem corii vittaque axillari subalbidis, puncto laterali corii alteroque in medio membranae ochraceis, capite, oculis, mesonoto pedibus antennisque sordido pallidis, his articulo primo lateribus rubris; capite triangulari, fronte inter oculos impresso, haec magnis, prominulis, granulatis sordido-pallidis; thorace transverso-trapezoidale, medio transversim impresso, inflexo, angulis anticis rotundatis, posticis acutis, lateribus marginatis, subalbidis, mesonoto valde exserto, transverso, postice arcuato subsinuato, antice bümpresso; scutello triangulari, subnitido, subalbo limbato;

hemelytris elongatis, thoracis latitudine, medio vix dilatatis, postice arcuato-attenuatis, apice subochraceis, vena laterali subdeclivis, appendices indistinctis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Leptomerocoris ? *albofasciatus* Motsch.

Figura Anthoc. nemor., sed duplo angustior; elongatus, parallelus, valde depressus, subopacus, nigro-fuscus, hemelytris fascia antice maculaque laterali postice albidis, antennarum articulis tribus ultimis pedibusque subalbido testaceis, geniculis tibiatarumque annulis vix distincto infuscatiss, oculis mediocris, convexis, rufis; capite minuto, triangulari, fronte convexo, antennis corpore paulo brevioribus, articulo 2-do primo plus triplo longiori, 4-o brevissimo; thorace trapezoidale, inaequale, impunctato, angulis posticis prominulis, apice subobtusis, mesonoto exserto, arcuato, transversim bimpresso; scutello triangulari, antice transversim subinflexo; hemelytris thoracis latitudine parallelis, postice rotundatis, vena lateralis antice solum distincta, appendices paulo exsertis; pedibus elongatis, linearis, tibiis nudis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Liocoris Motsch. n. g.

Tête médiocre, un peu allongée et coudée dessus, en face triangulaire; museau recourbé en dedans; rostre à peine aussi long que la moitié du corps, atténué vers son extrémité, composé de quatre articles, dont les trois

premiers courts, le dernier plus long que les précédents réunis, très-grêle, sétiforme et un peu courbé au bout; yeux un peu oblongs, convexes, saillants, ocelles nulles; antennes inserrées sur le front entre les yeux, grêles, filiformes, atteignant presque le bout des hémélytres, leur 1-er article peu élargi, de la longueur du corselet, le 2-d plus mince et un peu plus long, le 3-me encore plus mince mais d'un tiers plus court que le précédent, le 4-me encore un peu plus court et plus étroit. Corselet pas plus court que sa largeur postérieure, conique, convexe, fortement étranglé au milieu; mésonotum à peine visible. Hémélytres transparentes, veines latérales bien marquées dans toute leur longueur; cellules nulles; appendices bien saillants, en triangles allongés; corium divisé en deux par une nervure longitudinale. Pattes longues; cuisses étroites, simples; jambes finement pubescentes.

Liocoris glabratus Motsch.

Figura depressa Anthocori, sed thorace convexo, conico, medio strangulato; elongato-subovatus, postice valde depressus, glaber, nitidus, rufo-testaceus, oculis prominulis, nigris, membrana subalbida, haec lateribus appendicisque subtetaceis, fusco marginatis, hemelytrorum nervis, margine interiori maculaque gemina medio fusco-piceis, antenarum articulo primo, thoracis lateribus angustissime geniculis tibisque plus minusve rubriscentibus, femoribus basi subalbidis; capite minuto subelongato, postice angustato, impresso, calloso, oculis prominulis; thorace subconvexo, elongato, antice capite angustiore, utrinque coarctato, medio impresso, bifoveolato, pars antica globoso-conica, subcallosa, postica trapezoidali-convexa, angulis toruloso-prominulis; scutello triangulari, medio subimpresso; hemelytris

thoracis lalitudine, elongatis, medio vix arcuatis, fere parallelis, nervis omnis valde distinctis, medio paulo distantibus, figura uncinata)(*formantibus.*

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{5}$ l. Tab. II, fig. 20.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Une autre espèce, extrêmement voisine, habite les plantations de tabac à la Havane. Elle est un peu plus grande, surtout plus ovolaire et présente la moitié postérieure du corselet grossièrement ponctuée et avec deux grandes taches noires. Elle porte le nom de *Lioc. puncticollis* m.

Aradides.

Piestosoma picipes Walk.

Anthocoris funebris Motsch.

Depressus, oblongus, nitidus, niger, hemelytris sordido-subalbidis vel cinereis, his basi maculaque laterali postice nigris, rostello, antennarum tibis que apice, coxis tarsisque plus minusve fusco-testaceis, oculis prominulis piceo-rufescentibus; capite minuto, elongato - triangulari, nitido, vix punctulato; thorace transverso, subconvexo, antice posticeque crebre punctato, medio glabro, arcuatim sinuato impresso, linea longitudinali distincta, lateribus obliquis, antice arcuato - subdilatis; scutello magno, triangulari, postice lato-impresso, ruguloso - punctato; hemelytris thoracis lalitudine, corio et membrana sparsim punctatis, basi utrinque nervis duabus declivis instructis, sutura subelevata,

picea; femoribus anticis vix incrassatis; corpore subtus tenuissime punctato-ruguloso.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{3}{4}$ l. — $\frac{1}{2}$ l. (♂ ?)

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Anthocoris parallelus Motsch.

Depressus, elongatus, medio parallelus, nitidus, niger, membrana antice sordido-subalbida vel cinerea, postice infuscata, rostellum antennarumque apice, tibiis tarsisque plus minusve fusco-testaceis; capite minuto, triangulari, oculis vix prominulis, rufescente piceis, thorace trapezoidali, medio transversim impresso, antice subrotundato, calloso, postice dilatato, subconvexo, sparsim punctulato, basi concavo sinuato, angulis subproductis obtusis, mesonoto valde exserto, arcuato, subconvexo; scutello triangulari, medio antice lato impresso; hemelytris thoracis latitudine, venis et marginis interioribus omnis piceo marginatis, membrana thoracis latitudine non longiora, subtranslucida, cellulis nullis, appendicis valde exsertis, subrugosis, nigro-piceis; in ♂ femoribus incrassatis, in ♀ simplicibus; abdomine hemelytris apice distincto superante.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et des environs de Colombo.

Anthocoris tantillus Motsch.

Omnino Anth. fomicet. Bohem. sed thorace paulo transversiore, fortiter punctato; nigro-piceus, hemelytris testaceo

albidis, postice utrinque paulo infuscatis, abdomine fusco-testaceo, pedibus pallidioribus.

Long. $\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo; peut-être aussi un habitant des fourmilières?

Cimicides.

Cimex lectularius L.

Tingides.

Cymus basicornis Motsch.

Elongatus, depressus, vix nitidus, crebre punctatus, medio parallelus, diluto livido-testaceus, hemelytris subalbido-transparentibus, membranis margine interiori postice angustissimo infuscato, oculis minutis, subprominulis nigro-piceis; capite subquadrato, horizontali, punctato, fronte lineis duabus subarcuatis postice infuscatis longitudinaliter impressis, antennis antice ad marginem insertis, articulo 1-o crasso, subovato, punctato, capite duplo breviori, 2-do fere duplo longiori, tenuissimo, apice leviter incrassato, 3 et 4 desunt; thorace elongato-trapezoidali, vix convexo, fortiter punctato, antice medio subinflexo, unicarinato, carino postice obliterata, angulis posticis subprominulis, rotundatis; scutello subtransversim triangulari, rugoso-punctato, antice toruloso subelevato, apice albo-subcarinato, nitidissimo; hemelytris thoracis latitudine, elongatis, parallelis, postice subattenuato-rotundatis, corio et membrana sparsim punctatis, nervis indistinctis, laterali parallelo, punctato; abdomine albido.

Long. $1\frac{3}{5}$ l. — lat. $\frac{1}{2}$ l.

Des environs de Colombo.

Monanthia subovata Motsch.

Forma M. costatae, sed paulo longiore, capite longitudinaliter bicarinato, membranis carino recta, non arcuata; elongato-subovata, depressa, antice posticeque attenuata, punctata, costata, cellulosa, sordido fusco-testacea, oculis minutis, rotundatis, convexis, nigris; capite elongato-triangulari, angustato, utrinque carinato, carinis antice angulatim conjunctis, antennis sub oculos lateraliter insertis, insertione excavato, extus in dentem producto, illis articulo 1-o crasso, latitudine paulo longiori, antice sensim angustiori, 2-do brevissimo, obconico, 3 et 4 desunt; thorace elongato-trapezoidale, capite latiore, punctato, medio gibboso, antice impresso, postice lato arcuato, longitudinaliter 7 carinato, carina penultimo - laterali antice abbreviata, scutello sub thorace occulto; hemelytris thorace latioribus, ovato-dilatatis, fusco cellulosis, basi punctatis, postice attenuato-rotundatis, medio oblique unicarinatis, sutura subelevata, membranis vena laterali arcuata, valde distincta, appendicis nullis; pedibus tenuis, simplicibus.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. hemel. $\frac{2}{3}$ l.

Des environs de Colombo.

Une espèce voisine, plus étroite, se trouve en Algérie et se distingue principalement par sa couleur plus brunâtre, surtout des antennes et des pattes, qui sont presque noires. Je l'ai nommée: *Monanth. nigripes*.

Monanthia atra Motsch.

Figura Mon. Sacchari F., duplo minore, postice paulo angustiori, antennis gracilioribus, longissimis; color fere niger; elongata, depressa, antice attenuata, medio paulo

dilatata, postice arcuatim truncata, opaca, punctata, nigra, subalbo tenuissime carinulata, hemelytris sordido-albidocellulosis, lateribus angustissime albomaculatis, antennis pedibusque albescence-pallidis, apice subinfuscatis; capite angustato, elongato-triangulari, antice truncato, quadrispinoso, spinis lateralis brevioribus, ante oculos instructis, medio tenuissime bicarinulato, antennis ad marginem antice insertis, dimidio corporis longioribus, gracilis, articulo 1-o capite plus duplo breviori, subincrassato, cylindrico, basi nigro, 2 do paulo breviori et angustiori, 3-o dimidio corporis fere longitudine, 4-o dimidio brevior, leviter clavato; thorace capite latiore, subtropaeoidale, subconvexo, valde opaco, punctato, albo 5 lineato carinulato, carinis penultimis antice abbreviatis, tribus mediis supra corio prolongatis; scutello occulto; hemelytris elongatis, antice paulo ventricosus-dilatatis, postice fere parallelis, membranis venis vel costis marginalis interioribus postice arcuatim prolongatis, mediis lateralis fere rectis, parallelis; corpore subtus subovato, convexo, opaco, vix distincto punctulato, segmento ultimo magno, basi subcarinato, carina nitida; pedibus elongatis, filiformibus.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. hemel. ant. $\frac{2}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Monanthia ? tingoides Motsch.

Figura antice Tingidis postice Monanthiae, depressa, elongata, subparallela, scrobiculosocellulosa, opaca, carinata, sordido albescens, subfusco variegato, oculis, capite postice, thorace in fundo corporeque nigris, rostello, antennis pedibusque rufo testaceis, carinulis subalbidis; capite brevi, triangulari, inaequali, spinis nullis, oculis mediocris.

oblongis, paulo prominulis, granulatis, antennis in fronte insertis, approximatis, articulo 1-o capite paulo breviori, crasso, latitudine paulo longiori, antice paulo incrassato, 2-do dimidio breviori, postice arcuatim angustato, 3 et 4 desunt; thorace antice capitis latitudine, albo, postice ampliato-dilatato, lateraliter utrinque vesiculo-inflato oblecto, medio nigro, carinulis elongatis subalbidis tribus; scutello occulto; hemelytris thorace angustioribus, elongatis, fere parallelis, apice rotundatis, grosso cellulosi; subinfuscatis, lateribus postice maculaque subapicali translucidis, venis ut in priori sed dilutis; corpore subtus atro, ferrugineo annulato, opaco, segmento ultimo subtuberoso producto, nitido, rostellii sulco postice dilatato, albo-marginato; pedibus gracilis, femoribus leviter clavatis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. thor. post. $\frac{3}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Calloniana elegans Walk.

Reduvides.

Pirates marginatus Walk.

Acanthaspis sanguinipes Walk.

— fulvispina Walk.

Hydrométrides.

Ptilomera laticauda Hardw.

Nepides.

Belostoma indicum St. Farg. et Serv.

Nepa minor Walk.

Notonectides.

Notonecta abbreviata Walk.

— *simplex* Walk.

Corixa subjacens Walk.

Corixa albifrons Motsch.

Minuta, oblongo-subovata, nitida, sordido-albida, thorace transverso elytrisque longitudinaliter nigro-fusco lineatis, oculis magnis, triangulariter-subovatis, vix convexis, glaucis, fronte pedibusque pallido-albidis: capite transverso, glabro, nitidissimo, antice triangulari, subconvexo; thorace capitis latitudine, valde transverso-subovato, subtilissime ruguloso nitido, transversim trilineato; scutello minuto, triangulari, subinfuscato, antice impresso; hemelytris thoracis latitudine, medio leviter dilatatis, postice arcuatim-attenuatis, utrinque lineis fuscis 5, corii marginis oblique fusco-lineatis; corpore subtus opaco-subalbido, tarsi postici fusco-marginatis.

Long. $\frac{5}{6}$ l. — lat. hemelytr. $\frac{1}{2}$ l.

Des environs de Colombo.

VIII. HOMOPTÈRES.

Cercopides.

Penthimia rufopunctata Motsch.

Figura et color Penth. atrae, sed dimidio brevior; ovata, subconvexa, rugoso-punctata, nitida, nigra, dorso sparsim minutissimo rufo-maculoso, apice subalbido reticulato; capite lato, antice transversim subinflexo, marginato, oculis triangulariter-subovatis, albescentibus; thorace

transverse - subovato, postice arcuatim truncato, rugoso-punctato, mesonoto exserto, lato - trapezoidali, creberrime subtiliter punctato, subopaco; scutello nitido, triangulari, leviter transversim rugato; hemelytris coriaceis, nitidis, rugoso-punctatis, antice thorace paulo angustioribus, medio vix dilatatis, postice attenuatis; tibiis plus minusve distincto testaceo maculatis, posticis longissimis, biserialim rufescente spinosis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. elytr. $\frac{4}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Une espèce très-voisine, un peu plus courte se rencontre dans l'Amérique du Nord aux environs de la nouvelle Orleans. Elle est d'un noir brunâtre, avec la tête et l'extrémité des hémélytres plus ou moins blanchâtres, corselet fortement sinué en arrière et comme le chapéron transversalement ridé, écusson fortement prolongé en pointe entre les hémélytres. Je l'ai nommée *Penthimia? nigropicea*.

Penthimia melanocephala Motsch.

Figura tantum precedentis, sed thorace, scutello hemelytrisque rufo-ferrugineis, apice subalbido reticulatis, capite, corpore subtus pedibusque nigris, geniculis, tibiis tarsisque anticis et mediis rufo-ferrugineis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. elytr. $\frac{5}{6}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Une forme analogue mais deux fois plus petite, se rencontre aussi aux Etat-Unis de l'Amérique à la Louisiane, mais elle est dessus d'un blanc brunâtre varié,

avec l'écusson et une grande tâche postérieure sur chaque hémélytre d'un brun noirâtre. Le corelet et l'écusson sont formés comme chez la *Pent. nigropicea*. Elle porte le nom de *Pethimia? trimaculata* m.

Cercopis inclusa Walk.

Ptyelus costalis Walk.

Aphrophora lineatocollis Motsch. Et. Ent. 1859.
p. 110. +

Membracides.

Centrotus reponens Walk.

— *malleus* Walk.

— *substitutus* Walk.

— *decipiens* Walk.

— *relinquens* Walk.

— *imitator* Walk.

— *repressus* Walk.

— *terminalis* Walk.

Oxyrhachis indicans Walk.

Anomus reticulatus Fairm. *

— *mucronicollis* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 109. +

— *tuberculatus* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 109. +

Issides.

Hemisphaericus Schaumi Stal. +

— *bipustulatus* Walk.

Acocephalus porrectus Walk.

Scarisides.

Ledra rugosa Walk.

— *conica* Walk

Gypona prasina Walk.

*Tettigonides.**Tettigonia paulula* Walk.*Jassinides.*

Idiocerus? *subopacus* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 110. +
 $1\frac{2}{3}$ l. +

Pediopsis nigromaculatus Motsch. Et. Ent. 1859. p.
 111. $1\frac{1}{2}$ l. +

— *apicalis* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 110. $2\frac{1}{5}$ l. *

Jassus fusconervosus Motsch.

Elongatus, postice attenuatus, nitidus, sordido testaceo-albescens, hemelytris dilutioribus, nervis fusco-testaceis, dorsalibus paulo dilatatis, vertice inter oculos nigro unifasciato, fronte lateraliter transversim fusco-lineato, medio testaceo, linea longitudinali fusca, corpore subtus opaco, nigro-fusco maculato; capite lato, transverso, impunctato, clypeo paulo producto, oculis transversis, convexis, postice prominulis; thorace capitis fere latitudine, valde transverso, minus distincto strigoso punctato, antice arcuato, maculis vel punctis nigris transversim dispositis, postice truncato, angulis anticis prominulis, rotundatis, posticis obliquo truncatis, mesonoto trapezoidali, antice ad marginem trimaculato, postice concavo truncato; scutello triangulari, apice acutissime producto; hemelytris thoracis latitudine postice subarcuatim attenuatis, apice rotundato-truncatis, venis valde distinctis, pedibus gracilis, subfusco punctatis vel marginatis.

Long. $1\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{2}{3}$ l.

Des sommités du mont Patannos.

Jassus latruncularius Motsch. Et. Ent. 1859. p. 111.
1⁴/₅ l. +

Jassus ? curtulus Motsch.

Subabbreviatus, subdilatatus, fere parallelus, postice angulatim truncatus, subnitidus, supra fusco-testaceus, albido nigroque variegatus, subtus niger; capite triangulari, linea media albida, maculis duabus utrinque ochraceis, oculis magnis, oblongis, postice convexis, cinereo-fuscis, diluto limbatis, ocellis testaceis, antennis thoracis basi paulo superantibus, testaceis; thorace capitis latitudine, valde transverso, lateraliter angustato, albido trivillato, medio plus minusve testaceo, lateraliter nigro-piceo; scutello triangulari, nigro, subalbido marginato, interdum ad basin albo-bipunctato; hemelytris thoracis latitudine, medio leviter dilatato-arcuatis, corio cellulisque subfusco-testaceis, nigro marginatis, interstitiis lato albidis, fascia ablique ad marginem exteriori corii, macula sinuata in medio membranae fasciae interrupta versus apicem formantibus, tibi tarsisque anticis et mediis testaceo annulatis, posticis elongatis, setosis; abdomine supra testaceo hemelytris superante, oviducto in ♀ acuminato, capitis longitudine.

♂ Long. 1 l. — lat. elytr. $\frac{1}{2}$ l. — ♀ Long. 1⁴/₅ l. —
lat. elytr. $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Deltocephalus rubrolineatus Motsch.

Elongatus, medio leviter dilatato-arcuatis, postice truncatus, nitidus, supra subcoeruleo-viridis, longitudinaliter rubro lineatus, marginis flavioribus, corpore subtus pedibusque nigro-fuscis, abdominis segmentis albo-marginatis,

hemelytrorum apice infuscato; capite triangulari, rubro bilineato, medio longitudinaliter impresso vertice subconcavo, apice subreflexo, ad marginem punctis minutissimis nigris 4, fronte antice subinfuscato, punctis minutis albidis quinque (1, 3, 1.), medio rufo uniarcurato; oculis granulosis, elongato-subconicis, vix convexis, postice non prominulis, cinereis, postice rubris; thorace sex lineato, capite paulo latiore, valde transverso, postice convexo sinuato, angulis posticis rotundatis, marginatis, lateraliter vix distincto punctato; mesonoto trapezoidali, bilineato, medio subtiliter biimpresso, postice arcuato; scutello triangulari, apice paulo rubro; hemelytris elongato-subovatis, medio thorace paulo latioribus, obliquo rubro lineatis et versus apicem 4 maculatis, lineis postice abbreviatis, media paulo longiore, maculis tribus posticis brevis, anteriori valde elongato, inter lineis 3 et 2 posita.

Long. $2\frac{1}{3}$ l. — lat. elytr. med. $\frac{4}{5}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Deltocephalus variegatus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 112. 2 l. +

— *elongatoocellatus* Motsch. Et. Ent. 1859. $1\frac{3}{5}$ l. +

Quelquefois les ocelles brunâtres sur les hémélytres deviennent extrêmement faibles ou même disparaissent entièrement et alors la couleur du dessus est un testacé grisâtre, avec quelques nervures noirâtres. Une pareille variété a été prise sur les sommités du mont Patannas.

Deltocephalus distinctus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 112. 1 l. *

Deltocephalus guttatus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 113.
 $\frac{3}{4}$ l. *

— *dorsalis* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 114. $1\frac{1}{4}$ l. *

Deltocephalus ? *transparipennis* Motsch.

Elongatus, postice leviter arcuato - attenuatus, nitidus, dilute rufo testaceus, corpore subtus pedibusque pallidioribus, oculis oblongis, granulosis, antice albidis, postice nigris, capite thoraceque subfusco longitudinaliter variegatis, hemelytris sordido-subalbidis, paulo transparentibus, antice et lateraliter subrugulosis, venis interioribus nigrofuscis, exterioribus subalbidis; capite transversim triangulari, utrinque antice macula ferruginea, clypeo vix producto, subrotundato, fronte nitidissimo, rufo - testaceo, subconvexo, oculis convexis, postice prominulis; thorace capite paulo angustiore, transverso, arcuato, angulis posticis rotundatis, mesonoto trapezoidali, utrinque ferrugineo vittato; scutello triangulari, nitido, hemelytris thorace paulo latioribus, elongatis, medio vix dilatatis, infumato leviter nebulosis.

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Platymetopius lineolatus Motsch. Et. Ent. 1859. p. 114. 2. l. +

— *arcuatus* Motsch. Et. Ent. 1859. p. 115. 2 l. +

Le mâle de cette espèce présente les arcs du corselet et les lignes obliques d'un rouge vif.

Thamnotettix subrufa Motsch.

Elongata, subparallela, nitida, rufo - testacea, abdomine oculisque nigris, hemelytris albido-subpallidis, apice infus-

catis, venis albidis, pedibus pallidis; capite subtransverso, subconvexo, antice incrassato-truncato, impunctato, ocellis frontalibus, vix distinctis, oculis transverso subovatis, paulo prominulis; thorace capitis fere latitudine, valde transverso, inaequale, medio leviter carinulato, antico arcuato, postice subsinuato-truncato, angulis subrotundatis, metanoto trapezoidali, nitido cum scutello testaceo; hemelytris capitis latitudine, postice parallelis, translucidis, corio rugoso-punctato.

Long. $1\frac{1}{4}$, l. — lat. cap. $\frac{2}{3}$, l.

Des environs de Colombo.

Thamnotettix fumosa Motsch.

Elongatus, subparallelus, nitidus, testaceo-subfuscus, oculis abdomineque subtus nigris, hemelytris translucidis, albido infuscatis; pedibus pallidis; capite transverso, convexo, antice arcuato-subproducto, ocellis frontalibus, vix distinctis, oculis oblongis, postice paulo prominulis; thorace transverso, postice leviter angustato, subtilissime punctulato; mesonoto trapezoidali, marginato, scutello triangulari, nitido; hemelytris capitis latitudine, parallelis, apice rotundatis, leviter infuscatis.

Long. $1\frac{1}{4}$, l. — lat. cap. $\frac{1}{3}$, l.

Des sommités du mont Patannas.

Thamnotettix nigrobimaculata Motsch.

Praecedenti valde affinis, sed paulo minore, mesonoto maculis duabus nigris; elongata, medio leviter arcuata, ni-

tida, testacea, subfusco variegata, oculis subcinereis, abdomine subtus infuscato, medio pallido, hemelytris infumato-translucidis, venis dilutioribus, valde impressis; oculis antice subangulatim truncatis, vix prominulis; thorace capite fere latiore.

Long. 1 l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Diomma Motsch. n. g.

Forme allongé des *Typhlocyba*, avec une tête assez sensiblement triangulaire dessus et deux ocelles placées sur le milieu du dessus du chaperon (clypeus). Yeux allongés comme chez les Deltocéphales, tronqués en avant, chaperon paraît un peu marginé; front ample. Corselet transversal, atténué en avant, de la largeur de la tête en arrière. Hémélytres s'élargissant depuis la base vers le milieu et parallèles ensuite, cellules très-allongées, les apicales toutes ouvertes, au nombre de trois, dont les deux intérieures limitées par des veines droites et presque parallèles et l'extérieure par une nervure arquée latérale. Antennis setaceis, capite thoraceque longitudinalinis conjuncto aequalibus.

Diomma ochracea Motsch.

Elongata, subnitida, ochracea, capitis, thoracis hemelytrorumque marginis apiceque albo-maculatis, punctis tribus clypei abdomineque nigris, segmentis subtus albo marginatis, oculis postice subconico prolongatis, vix prominulis, cinereo-fuscis, fronte pedibusque pallidis; capite triangulari-postice valde profundo concavo-arcuato; thorace transverse-subovato, postice utrinque ad marginem puncto nigro-fusco,

mesonoto trapezoidali, deplanato, basi maculis nigris duabus; scutello mesonoto angustiori, triangulari; hemelytris antice sensim attenuatis, medio dilatatis, postice parallelis, fusco alboque maculatis, venis versus apicem albidis.

Long. $1\frac{1}{6}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l Tab. II, fig. 21.

Des sommités du mont Patannas.

Typhlocyba maculifrons Motsch.

Elongata, angustata, subnitida, pallido - subvirescens, clypei apice abdomineque nigris, hoc subtus testaceo variegato, hemelytris diluta virescente pallidis, apice paulo infuscatis, oculis ovatis, paulo prominulis, cinereo-nigris; capite transverso, postice valde concavo - arcuato, antice obtuso - subproducto, fronte vix convexo, ocellis nullis; thorace capite paulo angustiori, valde transverso, postice leviter dilatato, arcuatim truncato, medio subcinereo, angulis rotundatis, mesonoto cum scutello concreto, triangulare, antice inflexo; hemelytrom nervis vix distinctis

Long. 1 l. — lat. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Conometopus Motsch. n. g.

Forme allongée et svelte des *Typhlocyba*, mais chapeçon sensiblement avancé en triangle ou en cône. Tête triangulaire, fortement découpée en arrière; ocellles nulles; yeux allongés, nullement saillants, se présentant coniques quand on voit d'en haut; antennes sétacées, ne devant pas le corselet. Celui-ci transversal, un peu atténué en avant, de la largeur de la tête en arrière,

angles arrondis, mésonotum trapézoïdal, distinctement séparé de l'écusson, qui est triangulaire. Hémélytres luisantes, un peu transparentes, de consistance assez tendre dans toute leur longueur et colorées uniformément jusqu'à l'extrémité, nervures pas visibles. Pattes grêles, mais pas très-longues.

Conometopus inspiratus Motsch.

Elongatus, angustatus, postice parallelus, nitidus, albidus, dorso capitis thoracique macula elongato - triangulari sutura antice subsinuata apiceque fusco-piceis, hemelytris postice pedibusque subroseis, capitis thoracisque lateribus hemelytrorumque macula elongata humerali laetissime albidis; capite triangulari, postice valde concavo-arcuato, medio linea elongata subrosea; oculis elongatis, albissimis, ocellis nullis; thorace transverso, antice fuscior, postice concavo-arcuato, mésonoto trapezoidali, leviter fusco 4 vittato; scutello triangulari; hemelytris thoracis latitudine, elongatis, nitidis, nervis indistinctis.

Long. $1\frac{1}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l. Tab. II, fig. 22.

Très-jolie découverte de M. Nietner sur les sommités du mont Patannas.

Fulgorides.

Elidiptera Emersoniadia White.

Aphaena sanguinalis Westw.

Pyrops punctatus Ol.

Hotinus maculatus Ol.

— *fulvirostris* Walk.

— *coccineus* Walk.

Cicadides.

Cicada nubifera Walk.

— *limitaris* Walk.

Dundubia Larus Walk.

— *Clonia* Walk.

— *stipata* Walk.

Cixiides.

Eurybrachys tomentosa F.

— *dilatata* Walk.

— *crudelis* Westw.

Cixius nubilus Walk.

Cixius stigma Motsch.

Elongatus, dilatatus, postice parallelus, nigro-piceus, oculis, thoracis marginis costisque mediis quinque, abdominis segmentis margine pedibusque plus minusve rufescente-testaceis, oculis magnis, subconvexis rufo-cinereis, alis hyalinis, nervis stigmaque laterali postice nigro-piceis, venis transversalibus versus apicem paulo dilatatis; capite triangulari, dorso tricotato, costa media vix notata, fronte dilatato-tricotata, costis antice posticeque approximatis, testaceis; thorace capite latiore, diagonali-quadrato, antice anguste inverto, medio longitudinali 5 costato, costis duabus submediis paulo arcuatis; alis antice subdilatatis, postice parallelis, apice rotundatis.

Long. $2\frac{3}{4}$ l. — lat. alar. post. $1\frac{1}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Dictyophorides.

Ossa Motsch. n. g.

Forme horizontale et élargie des *Cixius*, mais hémélytres de consistance cartilagineuse sur leur moitié antérieure, luisantes, non transparentes. Tête horizontale, déprimée, à quatre faces distinctes; chaperon avancé en cône obtus et marginé; front très-horizontale, très-déprimé, elliptique, marginé, longitudinalement caréné au milieu; yeux ovalaires, assez petits, convexes mais peu saillants; ocelles nulles; rostre court; antennes sétacées comme chez les *Cixius*, insérées latéralement sous les yeux. Partie postérieure de la tête tronquée vers le milieu des yeux et recouverte d'une espèce de capuce fourchue, qui se prolonge latéralement jusqu'au-delà du milieu du corselet, ayant les angles postérieurs dilatés et réfléchis. Corselet plus large que la tête, triangulaire, avec trois carénules sur le dos, qui se réunissent à l'angle rentrant de l'excavation triangulaire de la capuce décrite plus haut, qui présente également trois carénules longitudinales divergentes. Ecusson très-petit, triangulaire. Hémélytres s'élargissant peu à peu vers leur milieu et devenant ensuite parallèles jusqu'à l'extrémité, qui est arrondie; nervures sur la partie cartilagineuse antérieure, très-élevées, cellules très-allongées, presque concaves, nervures sur la partie transparente postérieure moins élevées, toutes longitudinales; seulement le long de la marge oblique qui sépare ces deux parties, il y a des nervures transversales, un peu anguleuses; suture profondément sillonnée et tricarinée. Dessous du corps allongé-ovale, abdomen assez mou, terminé par un oviduc assez large, un peu cylindrique, un

peu plus court que le front, tronqué au bout, qui présente quatre petites taches blanches et quelques denticulations noires très-courtes, il est composé de deux parties longitudinalés, réunies par une suture saillante d'un brun luisant. Pattes grêles, mais ne dépassant pas en longueur les hémélytres, insertion des coxes intermédiaires très-rapprochée, jambes simples, les postérieures plus longues, armée chacune de deux petites dents noires sur la face extérieure et de plusieurs autres à l'extrémité ainsi que sur celles du 1-er et du 2-d articles tarsals.

Ossa dimidiata Motsch.

Elongata, dilatata, tectiformi depressa, nitida, viridis, capite, thorace suturaque subochraceis, hemelytris postice transparentibus, triangulariter infuscatis, apice dilutioribus, fronte, oculis, corpore subtus pedibusque plus minusve albidis; capite arcuato-triangulari, depresso, longitudinaliter tricarinato, postice inter oculos recto-truncato, cum collo furcato obducto, lateribus ad basin hemelytrorum fere prolongatis, collo medio dehiscente-tricarinato; thorace capite latiore, triangulare, postice arcuato, medio tricarinato, carinis antice arcuatim conjunctis; scutello minuto, triangulari, hemelytris versus medium sensim dilatatis, postice subparallelis, subhyalinis, antice coriaceis, nitidis, nervis elevatis, sutura canaliculata, longitudinaliter tricarinata.

Long. $2\frac{3}{4}$ l. — lat. élytr. post. $1\frac{1}{5}$ l. Tab. II, fig. 23.

Belle espèce trouvée sur les sommités du mont Pattannas.

Flatoides.

Flatoides hyalinus F.

— *tenebrosus* Walk.

Ricania hemerobii Walk.

Poeciloptera pulverulenta Guér.

— *sellaris* Walk.

— *Tennentina* White.

Asiracides,

Delphax marginalis Motsch.

Elongatus, postice subdilatatus, parallelus, sordido-testaceus, oculis abdomineque infuscatis, hemelytris hyalino-subinfumatis, nervis testaceis, costa marginali obscuriori, postice nigro; capite transverso, postice profundo bifoveolato, interstitiis marginato-elevatis, antice subarcuato-truncato, vix distincto rugoso-punctato, fronte medio lateralisque carinato, antennarum articulo 2-do incrassato, 1-o fere duplo longiori; thorace transverso-triangulari, dorso subtiliter bicarinulato, medio tenuissime bilineolato, postice subreflexo-marginato, hoc limbo antice lato, medio profundo sinuato; scutello triangulari, medio inflexo, transversim striguloso; hemelytris elongatis, antice arcuatim-dilatatis, postice parallelis, apice rotundatis, nervis antice elevatis.

Long. $1\frac{2}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{2}{5}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Delphax unistrigosus Motsch.

Tantum precedenti, sed hemelytris postice striga lateralis suturaeque, X formi, nigro-fuscis; elongatus, postice subdilatatus, parallelus, nigro-fuscus, capite, thoracis margine postice, hoc limbo antico, abdominis segmentis annulis supra pedibusque plus minusve sordido-testaceis; thoracis limbo antico lato, vix sinuato; hemelytris hyalinis, sutura

postice strigaeque laterali obliqua nigro-fuscis, nervis elevatis, fusco-testaceis, nonnullis piceo-crenulatis.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Delphax sordescens Motsch.

Figura precedenti, sed dilutior; elongatus, postice dilatatus, subparallelus, nitidus, sordido-testaceus, thorace rufescente-infusato, hoc carinulis tribus mediis scutellisque apice plus minusve albidis, abdomine pedibusque infuscatis, apice subalbidis, oculis oblongis, convexis, cinereis; capite transverso antice angustato, subproducto, longitudinaliter bisulcato, postice piceo-bifoveolato, fronte elongato-triangulari, albo tricarinato; thorace trapezoidali, medio tricarinato, marginis subreflexis, hoc limbo antico lato, postice simpliciter arcuato, angulis attenuatis, reflexis, rotundatis; hemelytris hyalinis, nervis impressis, testaceis; tibiis posticis tridentatis.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{3}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Delphax venosus Motsch.

Tantum D. sordescenti, sed thoracis medio linea albida lato, limbo antico distincto albido tricarinato, sutura hemelytrorum antice albida, venis posticis infuscatis, transversa laterali dilatato-fusca.

Long. $1\frac{1}{5}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{3}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Delphax albicollis Motsch.

Figura precedenti sed minor et praesertim brevior; elongatus, postice attenuatus, nitidus, sordido-testaceus, thorace corporeque nigro - piceis, hoc segmento medio supra laete ochraceo, thoracis limbo antico leviter dilatato, splendido-albido, antice leviter fusco-bipunctato, postice transverso-triangulariter exciso, angulis suboblique truncatis; capite transverso, vertice angustato, subexcavato, vix producto, antice bisulcato, postice subbifoveolato, oculis magnis, oblongis, subconvexis, cinereis; fronte elongato - triangulari, albo-tricarinato, carinis antice conjunctis; thorace triangulari, medio tricarinato, postice utrinque sinuato, marginato, interdum rufo-testaceo (♀ ?); scutello triangulari, bi-impreso, apice plus minusve albido; hemelytris hyalino-subinfumatis, nervis fusco-testaceis, antice subcrenulatis; tibus posticis lato-tridentatis, antennis testaceis, articulo 2-do primo fere triplo longiori.

Long. $\frac{4}{5}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{5}$ l.

Des environs de Colombo.

Delphax coloratus Motsch.

Tantum D. albicollis, sed color magis nigrescens, antennis nigris, pedibus nigropiceo annulatis, tarsi posticis digitatis, capite vertice albo-4 carinatis, carininulis mediis antice triangulariter conjunctis; thorace transverso, subopaco, nigro, postice lato arcuato, medio subinflexo, carinulis vix distinctis, lateraliter roseo; hoc limbo antico albissimo, medio leviter sinuato; scutello triangulari, nigro-piceo; hemelytris hyalinis, nervis antice testaceis, postice infuscatis, costa laterali nigra, abdomine nigro, segmento antico su-

pra rubro, medio infuscato, penultimis approximatis sordido-pallidis.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. cap. $\frac{1}{4}$ l.

Des environs de Colombo.

Mestus Motsch. n. g.

Forme raccourcie de quelques Deltocéphales, mais vertex étroit, pas avancé, front fortement tricariné, les carènes latéraux prolongés sur le dessus de la tête; antennes deux fois plus longues que la tête et le corselet, réunies et formées comme chez les *Delphax*, avec leur 2-d article trois fois plus long que le premier; yeux oblongs, saillants, sinués dessous. Corselet plus étroit que la tête; capuce sur le devant de ce dernier très-large, occupant presque la moitié de sa longueur. Écusson soudé au corselet et indistinct. Hémélytres cartilagineuses, non ou peu transparentes, ovalaires, atténuées ou tronquées en arrière et ne devant pas l'abdomen; nervures saillantes, quelquefois articulées et toutes longitudinales presque jusqu'à l'extrémité, de manière que les veines subradiale et postérieure, se rapprochant ici un peu de la veine médiane, donnent chacune un rameau qui atteint l'extrémité de l'hémélytre, tandis qu'eux-mêmes se réunissent à la veine médiane par deux petites nervures transversales formant un angle rentrant, depuis lequel il n'y a que deux nervures parallèles qui atteignent l'extrémité. Pattes longues et grêles, jambes postérieurs très-allongées, armées de trois épines, tarsi forts, leur 1-er article plus long que les suivants réunis.

Mestus morio Motsch.

Elongato-subovatus, nitidus, niger, antennis pedibusque sordido-pallidis, oculis piceis; capite transverso, convexo,

vertice subinflexo, tricarinato, carinulis antice arcuatim conjunctis, oblitaratis, fronte subalbido-tricarinato, carina media antice abbreviata, oculis magnis, oblongis, subprominulis; thorace transverso, postice acuto-producto, dehiscente-tricarinato, carina media tectiformi elevata, thoracis limbo antico lato, medio tectiformi elevato; hemelytris antice thoracis latitudine, versus mediam sensum dilatatis, postice paulo attenuatis, apice utrinque rotundatis, nervis elevatis, cellulis elongatis, subglabris, nitidis.

Long. $\frac{2}{3}$ l. — lat. elytr. med. $\frac{2}{5}$ l. Tab. II, fig. 24.

Des sommités du mont Patannas.

Mestus testaceus Motsch.

Figura precedenti, sed paulo major, sordido dilute-testaceus, nitidus, abdominis medio infuscato, thorace subalbido-trivittato vel carinato, hemelytris subtranslucido-testaceis, nervis elevatis, fusco-subarticulatis; capite transverso, vertice postice bifoveolato, antice acuto-4 carinato, carinis mediis apice approximatis, fronte tricarinato; thorace tri-, hoc limbo antico unicarinato; hemelytris ut in priori.

Long. 1 l. — lat. elytr. med. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia et Patannas.

Mestus ? nigropunctatus Motsch. (larva?)

Subovatus, nitidus, sordido fusco-testaceus, nigro variegatus, hemelytris subalbido-testaceis, macula humerali obliqua, nervorum punctis multis apiceque nigris, nitidis; capite et thorace ut in priori; hemelytris corpore brevioribus, apice rotundato truncatis; tibiis 4 anticis nigris, de-

pressis, subditatis ut in gen. Asiraca, sed antennarum articulo 2-do primo triplo longiori.

Long. $\frac{3}{4}$ l. — lat. elytr. post. $\frac{1}{2}$ l.

Des sommités du mont Patannas.

Probablement un genre nouveau, que je me suis abstenu de construire, parceque je ne suis pas certain que l'exemplaire décrit soit adulte.

Derbides.

Thracia pterophoroides Westw.

Derbe furcatovittata Stal.

Derbe ? crenatonervosa Motsch.

Elongata, compressa, dorso deplanata, carinata, nigropicea, capitis vertice, thoracis medio pedibusque plus minusve diluto fusco-testaceis, hemelytris valde infumato-translucidis, costa dorsali depressa, thoracis carinisque lateralis subargenteo-albidis, hemelytrorum nervis fusco-piceis, elevato-crenatulatis; capite transverso, postice valde profundo excavato, antice abrupte concavo-truncato, vertice quadrato, tricarinulato, oculis oblongis, convexis, subtu leviter sinuatis, antennarum articulo 1-o globoso; thorace transverso-quadrangulato, dorso deplanato, tricarinulato, postice angulatim producto, hoc limbo antico, angustissimo, subalbido marginato; scutello occulto; hemelytris verticalis, ad basin thoracis latitudine, postice sensim attenuatis.

Long. $2\frac{1}{2}$ l. — lat. elytr. axil. $\frac{3}{5}$ l. Tab. II, fig. 25.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

N° 3. 1863.

*Psyllides.**Diraphia ? indica* Motsch.

Figura et color Liv. junc., sed duplo major, alis magis transparentibus; subopaca, ferrugineo-testacea, pedibus dilutionibus, oculis rotundatis prominulis, nigris, alis nitidis, transparente-infumatis, costa laterali antice infuscata; capite triangulari, postice biimpreso, medio linea angustissima nigra, clypeo angustato, bilobo producto, antennarum articulo 1-o lato-obconico, 2-do breviori, catilliformi, sequentibus latentis; thorace ut in *Psylloe*, subconvexo, subtilissime punctulato, antice paulo angustato, lateraliter utrinque triplicato, plicatura antica apice subspinosa, limbo antico brevi, utrinque foveolato, mesonoto antice dilatato, postice arcuato, apice truncato; scutello minuto, triangulari, convexo; abdomine conico; alis abdomine fere duplo longioribus, verticalis, postice arcuatim attenuatis, apice paulo angulatis, nervis distinctis, paulo elevatis, cellulis subtilissime rugulosis.

Long. $1\frac{1}{2}$ l. — lat. thor. $\frac{2}{3}$ l. Tab. II, fig. 26.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Livilla ? nervosa Motsch.

Elongata, nitida, rufo-testacea, alis subpallido-albidis, nervis elevatis, antice crenatis, fusco-subdilatatis, oculis minutis, verticali-suboblongis, nigro-piceis; capite transverso, antice excavato-curvato, marginis acuto elevatis, fuscis; thorace capite fere triplo latiore, transverso-quadrangulato, lateraliter utrinque arcuatim angustato, inaequali, postice

truncato; scutello triangulari, vix nitido; hemelytris thorace paulo latioribus, postice leviter attenuatis.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. elytr. hum. $\frac{3}{8}$ l. Tab. II, fig. 27.

Des environs de Colombo.

Psylla marginalis Walk.

Psylla oculata Motsch.

Elongata, subgibbosa, vix nitida, dilute sordido-testacea, fusco variegata, oculis oblongis, roseo-coccineis, alis hyalinis, nervis nigro-piceis, sutura antice magis nigrescenti; capite inclinato-triangulari, medio linea longitudinali impresso, antice subtus dehiscente-furcato producto, oculis convexis, vix prominulis; thorace capite paulo latiori, subtransverso-quadrato, subgibboso, limbo antico angustato, subalbido, pronoto triangulari, postice arcuato, subalbido limbato, maculis 4 subfuscis, angulis lateraliter subacuto-productis, mesonoto lato, transverso, fusco 5 vittato, lateraliter utrinque angustato; scutello trapezoidale, convexo, subpallido-albido, medio subinfuscato, antice bifoveolato, postice transversim appendiculato; alis corpore duplo longioribus; femoribus anticis subincrassatis, subarcuatis; abdomine antice fusco-piceo.

Long. $1\frac{1}{3}$ l. — lat. elytr. hum. $\frac{1}{2}$ l.

Des Montagnes de Nura-Ellia.

Coccidides.

Locanium coffeae Walk.

Pseudococcus coffeae Nietner.

IX. LÉPIDOPTÈRES.

a) DIURNES.

Papilionides.

Ornithoptera Darsius G. R. Gray.

Papilio Diphilus Esp.

— Japhon G. R. Gray.

— Hector L.

— Romulus Cram.

— Polymnestor Cram.

— Crino F.

— Helenus L.

— Pammon L.

— Polytes L.

— Erithonius Cram.

— Antipathis Cram.

— Agamemnon L.

— Eurypilus L.

— Bathycles Zinck-Som.

— Saperdon L.

— dissimilis L.

Ponthia Nina F.

Pieris Eucharis Drury.

— Coronis Cram.

— Epicharis Godt.

— Nama Doubl.

— Remba Moore.

— Mesentina Godt.

— Severina Cram.

— Namouna Doubl.

— Phryne F.

- Pieris Paulina Godt.
 — Thestylis Doubl.
 Callosuna Eucharis F.
 — Danaë F.
 — Etrida Boisd.
 Idmais Calais Cram.
 Thestias Mariamne Cram.
 — Pirene L.
 Hebomoia Glaucippe L.
 Eronia Valeria Cram
 Callidryas Phillipina Boisd.
 — Pyranthe L.
 — Hilaria Cram.
 — Alcmeone Cram.
 — Thisorella Boisd.
 Terias Drona Horsf.
 — Hecabe L.

Nymphalides.

- Euploea Prothoe Godt.
 — Core Cram.
 — Alcathoë Godt.
 Danais Chrysippus L.
 — Plexippus L.
 — Aglae Cram.
 — Melissa Cram.
 — Limniacae Cram.
 — Juventa Cram.
 Hestia Jasonia Westw.
 Telchinia violae F.
 Cethosia Cyane F.
 Messarus Erymenthis Drury.

Atella Phalanta Drury.

Argynnis Niphe L.

— *Clagia* Godt.

Ergolis Taprobanae Westw.

Vanessa Charonia Drury.

Libythea Medhavina Walk.

— *Pushcara* Walk.

Pyrameis Cardui L.

— *Callirhoë* Hubn.

Junonia Limonias L.

— *Oenone* L.

— *Orithyia* L.

— *Laomedea* L.

— *Asteria* L.

Precis Iphita Cram.

Cynthia Arsinoe Cram.

Parthenos Gambrisius F.

Limenitis Calidusa Moore.

Neptis Heliodore F.

— *Columella* Cram.

— *aceris* F.

— *Jumbach* Moore.

— *Hordonia* Stoll.

Diadema Auge Cram.

— *Bolina* L.

Symphaedra Thyelia F.

Adolias Evelina Stoll.

— *Lubentina* F.

— *Vasanta* Moore.

— *Garuda* Moore.

Nymphalis Psaphon Westw.

— *Bernardus* F.

— *Athamas* Cram.

Nymphalis Fabius F.

Kallima Philarchus Westw.

— **Melanitis F.**

— **Banksia F.**

— **Leda L.**

— **Casiphone G. R. Gray.**

— **unpularis Boisd.**

Ypthima Lysandra Cram.

— **Parthalis Walk.**

Cyllo Gorya Walk.

— **Cathaena Walk.**

— **Embolima Walk.**

— **Neilgherriensis Guér.**

— **Purimata Walk.**

— **Pushpamitra Walk.**

Mycalesis Patnia Moore.

— **Gamaliba Walk.**

— **Dosaron Walk.**

— **Samba Moore.**

Caenonympha Euaspla Walk.

Emesis Echerius Stoll.

Lycaenides.

Anops Bulis Boisd.

— **Thetys Drury.**

Loxura Atymnus Cram.

Myrina Selimnus Doubl.

— **Triopus Cram.**

Amblypodia Longinus F.

— **Narada Horsf.**

— **Pseudocentaurus Don.**

— **quercetorum Boisd.**

Aphraeus Pindarus F.

- Etolus Cram.
- Hephaestos Doubl.
- Crotus Doubl.

Dipsas Chrysothallos Hübn.

- Isocrates F.

Lycaena Alexis Stoll.

- Baetica L.
- Cnejus Horsf.
- Rosimon F.
- Theophrastus F.
- Pluto F.
- Parana Horsf.
- Nyseus Guér.
- Ethion Boisd.
- Celeno Cram.
- Kandarpa Horsf.
- Elpis Godt.
- Chimonas Walk.
- Gandara Walk.
- Chorienis Walk.
- Geria Walk.
- Doanas Walk.
- Sunya Walk.
- Audhra Walk.

Polyommatus Akasa Horsf.

- Puspa Horsf.
- Laius Cram.
- Ethion Boisd.
- Cattigara Walk.
- Gorgippia Walk.

Lucia Epilus Westw.**Pithecopis Hylax F.**

Hesperides.

Goniloba Japetus Cram.

Pyrgus Superna Moore.

— Danna Moore.

— Genta Walk.

— Sydrus Walk.

Nisoniades Diocles Boisd.

— Salsala Moore.

— Toides Walk.

Pamphila Angias L.

Achylodes Temala Walk.

Hesperia Indrani Moore.

— Cinnara Moore.

— Gremius Latr.

— Cendochates Walk.

— Tiagara Walk.

— Sigala Walk.

Sphingidae.

Sesia Hylas L.

Macroglossa stellarum L.

— Syrans Boisd.

— Corythus Boisd.

— divergens Walk.

Calymnia Panopus Cram.

Chaerocampa Thyelia L.

— Nyssus Drury.

— Clotho Drury.

— Oldenlandiae F

— Lycetus Cram.

— Silhetensis Boisd.

Pergesa Actens Cram.
 Panacra vigil Guer.
 Daphnis Nerii L.
 Zolinia Morpheus Cram.
 Macrosila obliqua Walk.
 — discistriga Walk.
 Sphinx convolvuli L.
 Acherontia Satanas Boisd.
 Smerinthus Dryas Boid.

Castniides.

Eusemia bellatrix Westw.
 Aegocera Venulia Cram.
 — bimaculata Walk.

Zygaenides.

Syntomis Schoenherri Boisd.
 — Creusa L.
 — Imaon Cram.
 Glaucopis subaurata Walk.
 Enchromia Polymena Cram.
 — diminuta Walk.

Lithosides.

Scaptosyle bicolor Walker.
 Nyctemera lacticina Cram.
 — latistriga Walk.
 — Coleta Cram.
 Euschema subrepleta Walk.
 — transversa Walk.
 — vilis Walk.

- Chalcosia Tiberina** Cram.
 — *venosa* Anon.
Eterusia Aedea L.
Trypanophora Taprobanes Walk.
Heteropon scintillens Walk.
Hypso plana Walk.
 — *caricae* F.
 — *ficus* F.
Vitesso Zemire Cram.
Lithosia antica Walk.
 — *brevipennis* Walk.
Setina semifascia Walk.
 — *solita* Walk.
Doliche hilaris Walk.
Pitane conserta Walk.
Aemene Taprobanes Walk.
Dirades attaccoides Walk.
Cyllene transversa Walk.
 — *spoliata* Walk.
Bizone subornata Walk.
 — *peregrina* Walk.
Deiopeia pulchella L.
 — *Astrea* Drury.
 — *Argus* Koller.

b) NOCTURNES.

Arctiides.

- Alope ocellifera** Walk.
 — *Sangarida* Cram.
Tinolius eburneigutta Walk.
Cretonotus interrupta L.

Creatonotus emittens Walk.
 Acmonia lithosioides Walk.
 Spilosoma subfascia Walk.
 Cycnia rubida Walk.
 — sparsigutta Walk.
 Antheua discalis Walk.
 Aloa lactinea Cram.
 — candidula Walk.
 — erosa Walk.
 Amerila Melanthus Cram.
 Ammatho cunionotatus Walk.

Liparides

Artaxa guttata Walk.
 — varians Walk.
 — atomaria Walk.
 Acyphas viridescens Walk.
 Lacida rotundata Walk.
 — antica Walk.
 — subnotata Walk.
 — complens Walk.
 — promittens Walk.
 — strigulifera Walk.
 Amsacta ? tenebrosa Walk.
 Antipha costalis Walk.
 Anaxila notata Walk.
 Procodeca angulifera Walk.
 Redoa submarginata Walk.
 Euproctis virguncula Walk.
 — bimaculata Walk.
 — lunata Walk.
 — tinctifera Walk.

Cispia plagiata Walk.
 Dasychira pudibunda L.
 Lymantria grandis Walk.
 — marginata Walk.
 Enome ampla Walk.
 Dreata plumipes Walk.
 — geminata Walk.
 — mutans Walk.
 — mollifera Walk.
 Pandala dolose Walk.
 Charnides junctifera Walk.

Psychides.

Psyche Doubledoi Westw.
 Metisa plana Walk.
 Eumeta Cramerii Westw.
 — Templetonii Westw.
 Cryptotholea consorta Templet.

Notodontides.

Cerura liturata Walk.
 Sauropus alternans Walk.
 Nioda fusiformis Walk.
 — transversa Walk.
 Rilia lanceolata Walk.
 — basivitta Walk.
 Ptilomacra juvenis Walk.
 Elavia metaphaea Walk.
 Notodonta ejecta Walk.
 Ichthyura restituens Walk.

Limacodides.

Scopelodes unicolor Walk.

Messata rubiginosa Walk.

Miresa argentifera Walk.

— aperiens Walk.

Nyssia laeta Westw.

Neaera graciosa Westw.

Narosa conspersa Walk.

Naprepa varians Walk.

Drepanulides.

Oreta suffusa Walk.

— extensa Walk.

Arna apicalis Walk.

Panisa postica Walk.

Saturnides.

Attacus Atlas L.

— lunula Anon.

Antheraea Mylitta Drury.

— Assama Westw.

Tropaea Selene Hübn.

Bombycides.

Trabala basalis Walk.

— prasina Walk.

Lasiocampa trifascia Walk.

Megasoma venustum Walk.

Lebeda repanda Walk.

— plagiata Walk.

— bimaculata Walk.

— scriptiplaga Walk.

Cossinides.

Cossus quadrinotatus Walk.

Zeuzera leuconota Steph.

— *pusilla* Walk.

Hepialides.

Phassus signifer Walk.

Cymatophorides.

Thyatira repugnans Walk.

Bryophilides.

Bryophila semipars Walk.

Bombycoides.

Diphtera deceptura Walk.

Leucanides.

Leucania confusa Walk.

— *exempta* Walk.

— *inferens* Walk.

— *collecta* Walk.

Brada truncata Walk.

Crambopsis excludens Walk.

Glottulides.

Polytela gloriosa F.

Glottula Dominica Cram.

Chasmina pavo Walk.

— *cygnus* Walk.

Apamides.

- Laphygma obstans Walk.
 — trajiciens Walk.
 Prodenia retina Friv.
 — glaucistriga Walk.
 — apertura Walk.
 Calogramma festiva Don.
 Heliophobus discrepans Walk.
 Hydraecia lampadifera Walk.
 Apamea undecilia Walk.
 Celaena serva Walk.

Caladrinides.

- Amyna selenampha Guér.

Noctuides.

- Agrotis aristifera Guér.
 — congrua Walk.
 — punctipes Walk.
 — mundata Walk.
 — transducta Walk.
 — plagiata Walk.
 — plagifera Walk.

Nadénides.

- Eurois auriplena Walk.
 — inclusa Walk.
 Epiceia subsignata Walk.
 Hadena subcurva Walk.
 — postica Walk.
 — retrahens Walk.

Hadena confundens Walk.

— *congressa* Walk.

— *ruptistriga* Walk.

Ansa filipalpis Walk.

Xylinides.

Ragada pyrorchroma Walk.

Cryassa bifacies Walk.

Egelista rudivitta Walk.

Xylina deflexa Walk.

— *inchoans* Walk.

Héliotides.

Heliothis armigera Hübn.

Haemerosides.

Ariola coelisigma Walk.

— *dilectissima* Walk.

— *saturata* Walk.

Acontides.

Xanthodes tropica Guén.

— *olivacea* Walk.

— *fasciculosa* Walk.

— *signifera* Walk.

— *turpis* Walk.

— *mianoïdes* Walk.

— *approximans* Walk.

— *divulsa* Walk.

— *egens* Walk.

— *plenicosta* Walk.

— *determinata* Walk.

Xanthodes hypactroides Walk.

Chlumentia multilinea Walk.

Anthophilides.

Micra destituta Walk.

— *derogata* Walk.

— *simplex* Walk.

Eriopides.

Callopistria exotica Guén.

— *rivularis* Walk.

— *duplicans* Walk.

Eurhipides.

Penicillaria nugatrix Guén.

— *resoluta* Walk.

— *solida* Walk.

— *ludatrix* Walk.

Rhesala imparata Walk.

Eutelia farillatrix Walk.

— *thermesiides* Walk.

Plusiides.

Abrostola transfixa Walk.

Plusia aurifera Hübn.

— *verticillata* Guén.

— *agramma* Guén.

— *obtusisigna* Walk.

— *nigriluna* Walk.

— *signata* Walk.

— *dispellens* Walk.

— *propulsa* Walk.

Calpides.

Calpe minuticornis Guén.

Croesia emarginata F.

Deva conducens Walk.

Hemicérides.

Westermannia superba Hübn.

Hyblaeides.

Hyblaea Puera Cram.

— *constellata* Guén.

Nolasena ferrifervens Walk.

Genoptérides.

Cosmophila indica Guén.

— *xanthindyma* Boisd.

Anomis fulvida Guén.

— *iconica* Walk.

Gonitis combinans Walk.

— *albitibia* Walk.

— *mesogona* Walk.

— *guttanivis* Walk.

— *involuta* Walk.

— *basalis* Walk.

Eporedia damnipennis Walk.

Rusicanda nigratarsis Walk.

Pasipeda rufipalpis Walk.

Toxocampis.

Toxocampa metaspila Walk.

Toxocampa sexlinea Walk.

— *quinquelinea* Walk.

Albonica reversa Walk.

Polydesmides.

Polydesma boarmoides Walk.

— *erubescens* Walk.

Homoptérides.

Alamis spoliata Walk.

Homoptera basipallens Walk.

— *retrahens* Walk.

— *costifera* Walk.

— *divisistriga* Walk.

— *procumbens* Walk.

Diacuista homopteroides Walk.

Daxata bijungens Walk.

Hypogrammides.

Briarda precedens Walk.

Brana calopasa Walk.

Corsa lignicolor Walk.

Avatha includens Walk.

Gadirtha decrescens Walk.

— *impingens* Walk.

— *spurcata* Walk.

— *rectifera* Walk.

— *duplicans* Walk.

— *intrusa* Walk.

Ercheia diversipennis Walk.

Diomea rotundata Walk.

— *chloromela* Walk.

Diomea orbicularis Walk.

- *muscosa* Walk.
- *Dinumma* Walk.
- *placens* Walk.
- *geometroides* Walk.
- *perficita* Walk.
- *repulsa* Walk.

Abunis trimesa Walk.

Catéphides.

Cocytodes coerulea Guén.

- *modesta* Walk.

Catephia linteola Guén.

Anophia acronyctoides Guén.

Steiria subobliqua Walk.

- *trajiciens* Walk.

Aucha rolans Walk.

Aegilia describens Walk.

Maceda mansucta Walk.

Hypocalides.

Hypocala efflorescens Guén.

- *subsatura* Guén.

Catocalides.

Blenina donans Walk.

- *accipiens* Walk.

Ophidérides.

Ophideres Materna L.

- *fullonica* L.
- *Cajeta* Cram.

Ophideres Ancilla Cram.

— Salamina Cram.

— Hypermnestra Cram.

— multiscipta Walk.

— bilineosa Walk.

Potamophera Manlia Cram.

Lygniodes reducens Walk.

— disparans Walk.

— hypoleuca Guén.

Erébides.

Oxyodes Clytia Cram.

Ommatophorides.

Speiredonia retrahens Walk.

Sericia anops Guén.

— parvipennis Walk.

Patula macrops L.

Argiva hieroglyphica Drury.

Beregra replenens Walk.

Hypopyrides.

Spiramia Heliconia Hübn.

— triloba Guén.

Hypopyra vespertilio F.

Ortospana connectens Walk.

Entomogramma faultrix Guén.

Bendides.

Homaea clathrum Guén.

Hulodes caranea Cram.

— palumba Guén.

*Ophiuroides.**Sphingomorpha Chlorea* Cram.*Lagoptera honesta* Hübn.— *magica* Hübn.— *dodato* F.*Ophiodes discriminans* Walk.— *basistigma* Walk.*Cerbia fugitiva* Walk.*Ophisma laetabilis* Guén.— *deficiens* Walk.— *gravata* Walk.— *circumferens* Walk.— *terminans* Walk.*Achaea Melicerta* Drury.— *Mezentia* Cram.— *Cyllota* Guén— *Cyllaria* Cram.— *fusifera* Walk.— *signivitta* Walk.— *reversa* Walk.— *combinans* Walk.— *expectans* Walk.*Serrodos campana* Guén.*Naxia absentimacula* Guén.— *Onelia* Guén.— *calefaciens* Walk.— *calorifica* Walk.*Calesia hoemorhoda* Guén.*Hypaetra trigonifera* Walk.— *curvifera* Walk.— *condita* Walk.

Hypaetra complacens Walk.

— *divisa* Walk.

Ophiusa myops Guén.

— *albivitta* Guén.

— *Achatina* Sulz.

— *fulvotaenia* Guén.

— *simillima* Guén.

— *festinata* Walk.

— *pallidilinea* Walk.

— *luteipalpis* Walk.

Fodina stola Guén.

Grammodes Ammonia Cram.

— *Mygdon* Cram.

— *stolida* F.

— *mundicolor* Walk.

Euclidides.

Trigonodes Hippasia Cram.

Remigides.

Remigia Archesia Cram.

— *frugalis* F.

— *pertendens* Walk.

— *congregata* Walk.

— *opturata* Walk.

Focillides.

Focilla submemorans Walk.

Amphiganides.

Lacera capilla Guén.

Amphigonia hepatizans Guén.

Thermisides.

- Sympis rufibasis* Guén.
Thermesia finipalpis Walk.
 — *soluta* Walk.
Azasia rubricans Boisd.
Selenis nivisapex Walk.
 — *multiguttata* Walk.
 — *semilux* Walk.
Ephyrodes excipiens Walk.
 — *cristisfera* Walk.
 — *lineifera* Walk.
Capnodes maculicosta Walk.
Ballatha atrotumens Walk.
Daranissa digramma Walk.
Darsa defectissima Walk.

Uraptérides.

- Lagyra Talaca* Walk.

Ennomides.

- Hyperythra limbolaria* Guén.
 — *deductaria* Walk.
Orsonoba Rajaca Walk.
 — *Radiota* Walk.
Fascellina chromataria Walk.

Boarmides.

- Amblychia angeronia* Guén.
Boarmia sublavaria Guén.
 — *admissaria* Guén.

Boarmia raptaria Walk.

- **Medasina** Walk.
- **Bhurmitra** Walk.
- **Suiasasa** Walk.
- **diffluaria** Walk.
- **caritaria** Walk.
- **exclusaria** Walk.

Hypochroma minimaria Guén.

Gnophos Pulinda Walk.

- **Culataria** Walk.

Agathia blandiaria Walk.

Bulonga Ajaia Walk.

- **Chacoraca** Walk.
- **Chandubija** Walk.

Geométrides.

Geometra specularia Guén.

- **Nanda** Walk.

Nemoria caudularia Guén.

- **solidaria** Guén.

Thalassodes quadraria Guén.

- **catenaria** Walk.
- **immissaria** Walk.
- **Sisunaga** Walk.
- **adornataria** Walk.
- **meritaria** Walk.
- **coelataria** Walk.
- **gratularia** Walk.
- **chlorozonaria** Walk.
- **laesaria** Walk.
- **simplicaria** Walk.

Comibaena Divapala Walk.

- **impulsaria** Walk.

Celenna saturatoria Walk.
 Pseudoterpna Vivilaca Walk.
 Amaurinia rubrolimbaria Walk.

Palyades.

Eumelea ludovicata Guén.

- aureliata Guén.
- carnearia Walk.

Ephyrides.

Ephyra obrinaria Walk.

- decursaria Walk.
- Cacavena Walk.
- abhadraca Walk.
- Vasudera Walk.
- Susarmana Walk.
- Vutumana Walk.
- inaequata Walk.

Acidalides.

Drapetodes mitaria Guén.

Pomasia Psylaria Guén.

- Sunandaria Walk.

Acidalia olivaria Walk.

- adeptaria Walk.
- nexiaria Walk.
- addictaria Walk.
- actiosaria Walk.
- defamataria Walk.
- negataria Walk.
- actuaria Walk.
- caesaria Walk.

- Cabera falsaria Walk.
 — decussaria Walk.
 — fumularia Walk.
 — nigrorenaria Walk.
 Hyria elataria Walk.
 — marcidaria Walk.
 — oblataria Walk.
 — grataria Walk.
 — rhodinaria Walk.
 Timandra Ajuia Walk.
 — Vijuia Walk.
 Agyris deliaria Guén.
 Zanclopteryx saponaria Herr. Schäf.

Micronides.

- Micronia caudata F.
 — aculeata Guén.

Macarides.

- Macaria Eleonora Cram.
 — Varisara Walk.
 — Rhagivata Walk.
 — Palaca Walk.
 — honestaria Walk.
 — Sangata Walk.
 — honoraria Walk.
 — cessaria Walk.
 — subcaudaria Walk.
 Doava adjutaria Walk.
 — figuraria Walk.

Larentides.

- Sauris hirudinata Guén.

Camptogramma baccata Guén.

Blemyia Bataca Walk.

— *blitiaria* Walk.

Coremia Gomatina Walk.

Lobophora Salisuca Walk.

— *Ghosha* Walk

— *contributaria* Walk.

Mesogramma lactularia Walk.

— *scitaria* Walk.

Eupithecia recensitaria Walk.

— *admixtaria* Walk.

— *immixtaria* Walk.

Gathynia miraria Walk.

Platydidés.

Trigonia cydonialis Cram.

Hypénidés.

Dichromia Orosialis Cram.

Hypena rhombalis Guén.

— *jocosalis* Walk.

— *mandatalis* Walk.

— *quaesitalis* Walk.

— *laceratalis* Walk.

— *iconicalis* Walk.

— *labatalis* Walk.

— *obocerralis* Walk.

— *pactalis* Walk.

— *ruralis* Walk.

— *paritalis* Walk.

Hapena surreptalis Walk.

— *desertalis* Walk.

- Hapena ineffectalis** Walk.
 — **incongrualis** Walk.
 — **rubripunctum** Walk.
Gesonia obeditalis Walk.
 — **duplex** Walk.

Herménides.

- Herminia timonalis** Walk.
 — **diffusalis** Walk.
 — **interstans** Walk.
Adrapsa ablualis Walk.
Bertula adjudicalis Walk.
 — **raptatalis** Walk.
 — **contigens** Walk.
Bocana jutalis Walk.
 — **manifestalis** Walk.
 — **ophiusalis** Walk.
 — **vagalis** Walk.
 — **turpatalis** Walk.
 — **hypernalis** Walk.
 — **gravatalis** Walk.
 — **tumidalis** Walk.
Orthaga Euadralis Walk.
Hipoepa lapsalis Walk.
Lamura oberratalis Walk.
Echana abovalis Walk.
Dragana pansalis Walk.
Pingrasa accuralis Walk.
Egnasia ephyradalis Walk.
 — **accingalis** Walk.
 — **participalis** Walk.
 — **usurpatalis** Walk.

Berresa natalis Walk.
 Imma rugosalis Walk.
 Chusaris retatalis Walk.
 Corgatha zonalis Walk.
 Catada glomerata Walk.
 — captiosalis Walk.

Pyralides.

Pyralis igniflualis Walk.
 — Palesalis Walk.
 — reconditalis Walk.
 — Idalialis Walk.
 — Janassalis Walk.
 Aglossa Gnidusalis Walk.
 Labanda herbealis Walk.

Ennychides.

Pyrausta absistalis Walk.

Asopides.

Desmia afflictalis Guén.
 — concisalis Walk.
 Aediodes flavibasalis Guén.
 — effertalis Walk.
 Samea gratiosalis Walk.
 Asopia vulgaris Guén.
 — falsidicalis Walk.
 — abruptalis Walk.
 — latimarginalis Walk.
 — praeteritalis Walk.
 — eryxalis Walk.
 — roridalis Walk.

- Agathodes ostentalis Geyer.
 Leucinades orbonalis Guén.
 Hymenia recurvalis F.
 Agrotera suffusalis Walk.
 — decessalis Walk.
 Isopteryx melaleucalis Walk.
 — impulsalis Walk.
 — spilomelalis Walk.
 — acclaralis Walk.
 — abnegatalis Walk.

Hydrocampides.

- Oligostigma obitalis Walk.
 — votalis Walk.
 — Cataclysta Herr. Sch.
 — dilucidalis Guér.
 — bisectalis Walk.
 — blandialis Walk.
 — elutalis Walk.

Spilomélides.

- Lepyrodes geometralis Guén.
 — lepidalis Walk.
 — peritalis Walk.
 Phalangiodes Neptisalis Cram.
 Spilomela meritalis Walk.
 — abdicalis Walk.
 — decussalis Walk.
 — aurolinealis Walk.
 Nistra coelatalis Walk.
 Pagyda salvalis Walk.
 Massepha absolutalis Walk.

*Margarodides.***Glyphodes diurnalis** Guén.— **decretalis** Guén.— **coesalis** Walk.— **univocalis** Walk.**Phakellura gazorialis** Guén.— **Margarodes** Guén.— **psiltacalis** Hübn.— **pomonalis** Guén.— **hilaralis** Walk.**Pygospila Tyresalis** Cram.**Neurina Procopialis** Cram.— **ignibasalis** Walk.**Ilurgia defamalis** Walk.**Maruca ruptalis** Walk.— **caritalis** Walk.*Botydes.***Botys marginalis** Cram.— **sellalis** Guén.— **multilinealis** Guén.— **admensalis** Walk.— **abjungalis** Walk.— **rutilalis** Walk.— **admixtalis** Walk.— **celatalis** Walk.— **deductalis** Walk.— **celsalis** Walk.— **vulsalis** Walk.— **ultimalis** Walk.— **tropicalis** Walk.

Botys abstrusalis Walk.

— **ruralis** Walk.

— **adhoesalis** Walk.

— **illialis** Walk.

— **stultalis** Walk.

— **adductalis** Walk.

— **histricalis** Walk.

— **illectalis** Walk.

— **suspicalis** Walk.

— **Janassalis** Walk.

— **Nephealis** Walk.

— **Cynaralis** Walk.

— **Dialis** Walk.

— **Thaisalis** Walk.

— **Dryopealis** Walk.

— **Myrinalis** Walk.

— **phycidalis** Walk.

— **annulalis** Walk.

— **brevilinealis** Walk.

— **plagiatalis** Walk.

Ebulea aberratalis Walk.

— **Camillalis** Walk.

Pionea actualis Walk.

— **Optiletalis** Walk.

— **Jubesalis** Walk.

— **brevialis** Walk.

— **suffusalis** Walk.

Scopula revocatalis Walk.

— **turgidalis** Walk.

— **volutatalis** Walk.

Godara pervosalis Walk.

Herculia bractialis Walk.

Mecynà deprivalis Walk.

*Scoparides.***Scoparia murificalis** Walk.— **congestalis** Walk.— **Alconalis** Walk.**Davana Phalantalis** Walk.**Darsania Niobesalis** Walk.**Dosara caelatella** Walk.— **lapsalis** Walk.— **immeritalis** Walk.*Chloreutides.***Niaccaba sumptialis** Walk.**Simaethis Clatella** Walk.— **Damonella** Walk.— **Bathusella** Walk.*Phycides.***Myelois actiosella** Walk.— **bractiatella** Walk.— **cautella** Walk.— **adaptella** Walk.— **illusella** Walk.— **basifuscella** Walk.— **Ligeralis** Walk.— **Marsyasalis** Walk.**Dascusa Valensalis** Walk.**Daroma Zeuxoalis** Walk.— **Epulusalis** Walk.— **Timeusalis** Walk.

- Homoesoma gratella** Walk.
 — **Getusella** Walk.
Nephoptyx Etolusalis Walk.
 — **Cyllusalis** Walk.
 — **Hylasalis** Walk.
 — **Acisalis** Walk.
 — **Harpaxalis** Walk.
 — **Aeolusalis** Walk.
 — **Argiodesalis** Walk.
 — **Philiasalis** Walk.
Pempelia laudatella Walk.
Prionapteryx Lincusalis Walk.
Pindictora Acreonalis Walk.
 — **Annusalis** Walk.
 — **Thysbesalis** Walk.
 — **Linceusalis** Walk.
Lacipea muscosella Walk.
Araxes admotella Walk.
 — **decusella** Walk.
 — **celsella** Walk.
 — **admigratella** Walk.
 — **coesella** Walk.
 — **candidatella** Walk.
Catagela adjurella Walk.
 — **acricuella** Walk.
 — **lunulella** Walk.

C r a m b i d a e.

- Crambus coccinellus** Walk.
Darbhaca inceptella Walk.
Jartheza honorella Walk.
Bulina solitella Walk.

- Bembina Cyanusalis** Walk.
Chilo odatella Walk.
 — **gratiosella** Walk.
 — **aditella** Walk.
 — **blitella** Walk.
Dariausa Eubusalis Walk.
Arrhade Ematheonalis Walk.
Darnensis Strephonella Walk.

Chloephorides.

- Thagora figurans** Walk.
Earias chromatana Walk.

Tortricides.

- Lazotaenia retractana** Walk.
Peronea divisana Walk.
Lithogramma flexilineana Walk.
Dictyopteryx punctana Walk.
Hemona fasciculana Walk.
Achroia tricingulana Walk.

Yponomeutides.

- Alteva niveigutta** Walk.

Gelechides.

- Depressaria obligatella** Walk.
 — **fimbriella** Walk.
Decuaria mendicella Walk.
Gelechia nugatella Walk.

- Gelechia calatella Walk.
 — deductella Walk.
 — Perionella Walk.
 Gizama blandiella Walk.
 Enisipia falsella Walk.
 Gapharia recitatella Walk.
 Goesa decusella Walk.
 Cimitra seclusella Walk.
 Ficulea blandulella Walk.
 Fresilia nesciatella Walk.
 Gesontha captiosella Walk.
 Aginis hilariella Walk.
 Cadra defectella Walk.

Glyphytides.

- Glyphyteryx scitutella Walk.
 Hybele mansuetella Walk.

Tinéides.

- Tinea tapetzella L.
 — receptella Walk.
 — pelionella L.
 — plagiferella Walk.

Lyonétides.

- Gracilaria coffeifoliella Motsch. Et. ent. 1859. p. 169.
 1¹/₃ l. +
 Cachura objectella Walk.