

etwas schmaler als der Durchmesser des ersten Fühlergliedes. Das Schildchen ist in der Mitte kräftig gewölbt, etwa ebenso lang wie breit, viel kürzer als der Halsschild. Die Hemielytren länger als der Hinterkörper, das Corium innen zur Spitze fast unpunktiert, der Cuneus etwas länger als breit. Die grosse Membranzelle ziemlich kurz und breit gerundet. Die Flügelzelle ohne Hamus. Die Propleuren kräftig punktiert. Die Rima orificiorum des Metastethiums wie bei *Camptobrochis* gebaut. Die Beine ziemlich kurz, lang abstehend behaart, die Schienen unbedornt, das erste Fussglied kaum länger als das zweite, die Arolien der Klauen kurz, kürzer als die halbe Länge und mit denselben verwachsen.

Erinnert sehr an *Camptobrochis* Fieb. und *Deraeocoris* Stål, unterscheidet sich aber durch den Bau der Arolien.

Typus: *Ps. pilosus* n. sp.

***Pseudocamptobrochis pilosus* n. sp.**

Gelbgrau, zwei Querflecke jederseits hinten und einige in der Mitte abgebrochene feine Querstriche auf der Stirn, zwei Längsstriche auf dem Clypeus, die Punkte im Grunde, Zeichnungen auf den Calli des Halsschildes, zwei mehr oder weniger ausgedehnte Flecke auf dem Schildchen, mehr oder weniger ausgedehnte Zeichnungen auf dem Clavus und auf dem Corium, die Spitze des Cuneus und ein Fleck auf den Mesopleuren schwarz, die Membran gelb, der Hinterrand, einige Flecke in der Mitte und die Venen hinten braun, die Fühler gelbbrot, das zweite Glied zur Spitze und die zwei letzten schwarz, die Basis des dritten gelb; das Rostrum schwarzbraun mit gelber Basis, die Beine gelb, ein Fleck auf den Hüften, die Schenkel mit reihenweise geordneten Punkten, und an der Basis und der Spitze, die Basis, die Mitte und die Spitze der Schienen und die Füße braun.

Das zweite Fühlerglied etwa viermal länger als das erste. Die Stirn ist sowohl beim ♂ wie auch beim ♀ dop-