

Sehr nahe mit *F. nigricornis* POPPIUS aus Neu-Guinea verwandt, unterscheidet sich aber durch andere Farbe, durch etwas grösseren Kopf mit grösseren Augen, durch längere, anders gebaute Fühler, sowie durch breiteren, nach vorne kräftiger verengten Hinterlobus des Halsschildes.

Java: Nongkodjadar, I. 1911, E. JACOBSON, 1 ♀ (Museum Helsingfors).

### 53. *Pachypeltis vittiscutis* BERGROTH.

Java: Diese zuerst aus Java beschriebene und in dem Malaischen Archipel weit verbreitete Art war nur in einem Stück von Srondol bei Semarang, VIII. 1909, vorhanden. E. JACOBSON.

### 54. *Pachypeltis javanus* n. sp.

Glänzend; halb abstehend, kurz, gelblich behaart. Gelbbraun; eine Längslinie vorne auf der Stirn, der Clypeus, die Augen, auf dem Halsschilde die Seiten der Calli und ein grosser Fleck jederseits auf dem Basallobus, die Basalecken des Schildchens, ein Längsfleck hinten in der Mitte und der Aussenrand an der Emboliumgrenze fast bis zur Mitte auf dem Corium, der Cuneus, die Basis und der Aussenrand bis zur Mitte ausgenommen, die Metapleuren, der Hinterkörper unten an den Seiten vom vierten Segmente an, die Lege-scheide und die angrenzenden Teile der Segmente, sowie das zweite Fühlerglied und die Hinterhüften schwarz; das erste Fühlerglied und die vorderen Hüften gelbbrot (die übrigen Teile der Beine mutiliert); das zweite Fühlerglied an der Basis braun (die zwei letzten Fühlerglieder mutiliert).

Der Kopf ist vertical, von vorne gesehen kaum länger als breit, von der Seite gesehen länger als hoch. Die Stirn ohne Längsfurche, vorne kräftig gewölbt, von der Seite gesehen leicht aufgetrieben, beim ♀ etwa doppelt so breit wie der Durchmesser des Auges. Der Clypeus wenig hervortretend,