

7. ORTHOCEPHALUS ALUTACEUS Fieb. (inédit).

(Pl. 7, fig. 1.)

D'un noir brillant, glabre avec seulement quelques longues soies sur les côtés du pronotum. Tête ponctuée, son bord postérieur rougeâtre; premier article des antennes noir (les suivants manquent). Pronotum ridé en travers postérieurement, lisse sur les callosités; écusson ridé transversalement. Élytres d'un jaune pâle, avec le bord scutellaire brun; élargies en arrière, tronquées et sans membrane, couvertes d'une ponctuation fine, ruguleuse. Abdomen noir, lisse en dessus, sa tranche étroitement rougeâtre. Fémurs noirs, leur extrémité et les tibias jaunâtres. ♀.

Longueur : 3 millimètres.

Cette espèce, qui est à peine plus grande que le *minor* Costa, ne ressemble à aucune autre par sa coloration.

Je n'en possède qu'un individu femelle, que j'ai trouvé à Madrid.

ALLOCOTUS Fieb. (inédit), nov. gen.

(Pl. 7, fig. 2.)

Tête en triangle obtus en avant; bord postérieur tranchant, légèrement élevé en carène; face oblique, inclinée; épistome saillant, séparé du front par un sillon transverse; yeux saillants. Bec atteignant le premier segment abdominal. Pronotum court, trapézoïdal, sans bourrelet au bord antérieur, qui est droit comme le postérieur; callosités peu apparentes. Deuxième article des antennes cylindrique, plus long que la tête et le pronotum réunis. Ailes inférieures sans *hamus*. Tibias à soies raides, deuxième article des tarses postérieurs un peu plus long que le précédent et que le suivant. Dessus du corps pubescent et sétuleux.

Ce genre doit être placé dans le Système de Fieber à côté des *Litocoris*, dont il diffère par la tête carénée en arrière, le pronotum plus court et