

## Nya Svenska Capsider, antecknade

af O. M. REUTER.

[Meddeladt den 15 April 1874.]

I sina *Opuscula entomologica IV* har Adjunkten C. G. THOMSON meddelat en »Öfversigt af Sveriges *Capsini*». Ehuru i systematiskt hänseende, hvad beträffar indelningen och ordnandet af det för handen varande materialet, ganska förtjenstfull, lemna i fråga varande Öfversigt med afseende å fullständighet likväl åtskilligt öfrigt att önska. Så äro t. o. m. några redan förut såsom svenska beskrifna arter utlemnade. Då vi från Sverige hafva oss bekanta 25 species, hvilka THOMSON icke upptager, torde en förteckning öfver dessa icke vara opåkallad<sup>1)</sup>.

\*1. *Teratocoris Saundersi* DOUGL. et SCOTT, Ent. Monthl. Magaz. 1869 p. 260, 2. *T. Flori* J. SAHLB., Not. Skpts pro F. et Fl. F. Förh. XI, p. 290, 79.

Denna på *Phragmites* i sydvestra Finland och på Åland allmänt förekommande art är tagen vid Stockholm af BOHEMAN, som troligen sammanblandade den med sin *T. antennatus*, och vid Strömstad på *Heleocharis* af förf.

\*2. *T. paludum* J. SAHLB., Not. XI, p. 291, 80.  
Tagen af STÅL i Södermanland.

\*3. *Phytocoris distinctus* DOUGL. et SCOTT, Brit. Hem. p. 302, 1 (sec. specimina a DOUGLAS missa).

Species *Ph. Populi* FALL. similis, sed minor, magis nigricans, parcius albido-irrorata, antennis brevioribus.

Funnen i Småland af BOHEMAN.

\*4. *Phyt. intricatus* FLOR, Rhynch. Livl. II p. 603, 7.

Tagen vid Stockholm af BOHEMAN.

<sup>1)</sup> Deri upptagas äfven de af BOHEMAN utlemnade förut såsom svenska kända arterna. Alla öfriga arter äro utmärkta med en asterisk.

\*5. *Phyt. crassipes* FLOR., Rhynch. Livl. II p. 606, 8. *Phyt. Populi* ZETT., Ins. Lapp. p. 273, 9 (sec. spec. typ.). *Capsus minor* THOMS., Opusc. ent. IV p. 418, 3 (verisimiliter).

Funnen i Lappland af ZETTERSTEDT och vid Stockholm af BOHEMAN. Lefver på *Pinus sylvestris*.

\*6. *Lygus Spinolæ* MEY., FIEB., Eur. Hem. p. 275, 8.

Ett exemplar förvaras i Svenska Riksmuseum. Jag har funnit den talrik på *Spiræa salicifolia* vid Hønefos i Norge.

7. *Campyloneura virgula* H.-SCH., FIEB., Eur. Hem. p. 261, 1. Tagen i Skåne af BOHEMAN.

\*8. *Tythus flaveolus* REUT., Not. Skpts pro F. et Fl. F. Förh. XI p. 323, 4.

Funnen af HAGLUND i Östergötland.

\*9. *Orthotylus concolor* KIRSCHB., FIEB., Eur. Hem. p. 289,

5. *Litosoma concolor* DOUGL. et SCOTT Brit. Hem. p. 340, 6 (sec. specimina). *Capsus Sarrothamni* BOH. in Mus. Holmiæ.

Var. b. Capite, pronoto antice, femoribus corporeque subtus flavescens. ♂, ♀.

Var. c. Totus flavescens. ♂.

Tagen på *Sarrothamnus* i Skåne af BOHEMAN.

\*10. *Macrolophus nubilus* H.-SCH., FIEB., Eur. Hem. p. 322, 2.

Några exemplar äro funna af förf. på Djurgården vid Stockholm på *Urtica dioica*.

11. *Pilophorus bifasciatus* F., REUT., Not. Skpts pro F. et Fl. F. Förh. XIV p. 24, 43. *Camaronotus cinnamopterus* KIRSCHB., FIEB., Eur. Hem. p. 314, 1. *Capsus confusus* THOMS., Opusc. ent. IV p. 442, 83 verisimiliter.

Lefver på *Pinus sylvestris*, går ända upp till Lappmarken.

\*12. *Apocremnus Quercus* KIRSCHB., FIEB., Eur. Hem. p. 304, 3 (sec. determin. FIEBERI).

Ett exemplar, taget af BOHEMAN vid Stockholm och bestämdt af FIEBER, förvaras å Svenska Riksmuseum.

\*13. *Psallus alnicola* DOUGL. et SCOTT, Entom. Monthl. Mag. Ps. *Alni* DOUGL. et SCOTT, Brit. Hem. p. 414, 4 (sec. specimina a DOUGLAS et SCOTT missa).

I mellersta och södra Sverige enl. exemplar ur SCHÖNHEERS samling.

\*14. *Ps. lepidus* FIEB., Eur. Hem. p. 307, 7. DOUGL. et SCOTT, Brit. Hem. p. 416, 6 (sec. specimina a DOUGL. et SCOTT missa).

Var. b. Var. a. cetero similis, sed supra unicolor, sanguineo-brunescens, capite tantum pallidiore, flavescens, atomis capitis et pronoti totis evanescentibus, cuneo basi angustissime albido, membrana fumata, tantum sub apice cunei macula albida notata, venis rufis.

Båda varieteterna äro tagna af förf. på *Fraxinus* vid Strömstad. Äfven funnen i Östergötland af HAGLUND.

\*15. *Ps. albicinctus* KIRSCHB., FIEB., Eur. Hem. p. 307, 5. Denna af förf. vid Köpenhamn tagna art förekommer helt säkert äfven i Skånes bokskogar.

\*16. *Ps. diminutus* KIRSCHB., FIEB., Eur. Hem. p. 309, 16. På *Quercus* i södra och mellersta Sverige, flerstädes troligen ej sällsynt.

\*17. *Ps. varians* H.-SCH., FIEB., Eur. Hem. p. 309, 14. Funnen vid Stockholm, i Blekinge, Östergötland, Småland och Skåne samt på Gotland af BOHEMAN. Lefver på *Quercus*.

\*18. *Ps. lapponicus* n. sp. Oblongus (♂) vel oblongo-ovatus (♀) permodice nitidus, capite pronotoque opacis, sublævis, supra dilute brunneus vel rufo-brunnescens, subtus brunnescens vel dilute roseus; supra subtiliter fulvo-pubescentis; antennis lutescentibus, pilosulis; corio margine apicali angustissime albido; cuneo apice concolore, basi sat late pallido; membrana dilute fumata, venis rufescentibus, macula majore sub apice cunei hyalina postice dilute fusco-umbrata notata; pedibus albidis, femoribus sat parce et subtiliter fusco-rufo- vel fusco-punctatis, posticis incrassatis, tibiærum spinis nigris ex punctis fuscis nascentibus; capite magno, crasso. Long.  $4\frac{1}{4}$  m.m.

*Mas.* Segmento ultimo ventrali infra carinato.

*Femina:* Vagina basin abdominis fere attingente.

Två exemplar (♂, ♀) äro tagna i mellersta Lappland af BOHEMAN. Species inter congeneres magna et insignis. *Ps. variantis* H.-SCH. var. *nigricanti* FIEB. haud dissimilis, capite majore, inter oculos distincte latiore, antennis pilosulis, capite pronotoque subopacis distinguenda. Corpus oblongum (♂) vel oblongo-ovatum (♀), supra pilis aureolis pubescens, subtus subtiliter albido-pubescentis. Caput sat magnum, basi longitudine latius, brunnescens vel rufescens, opacum. Oculi sat magni, nigro-rufi; spatium interoculare latitudine oculi paullo plus duplo (♂) vel plus duplo et dimidio (♀) latius; apud *Ps. variantem*, cujus oculi maris majores et magis prominentes, vix dimidio (♂) vel duplo (♀) latius. Antennæ lutescentes, pilosulæ, corporis dimidio longiores, articulo secundo maris paullo crassiore, tertio secundo circiter  $\frac{1}{3}$  brevior, quarto tertio circiter duplo brevior. Rostrum longum medium ventris superans (♂) vel attingens (♀), luteum, apice picescente. Pronotum trapezoidale, margine antico longitudine subæquilatum, margine postico recto longitudine duplo latius, brunnescens vel antice luteo-rufescens, opacum. Hemytra brunnescentia, nitidiuscula, margine apicali corii angustissime albido, corio margine laterali cuneo triplo longiore. Cuneus, membrana et pedes supra in diagnosi descripta. Tarsi apice fusci.

\*19. *Agallia pullus* REUT., Not. ur Skpts pro F. et Fl. F. Förh. XI p. 224, 5.

Funnen vid Stockholm af STÅL och vid Strömstad af förf.

20. *Ag. pinetellus* ZETT., Ins. Lapp. p. 276, 30 (*Phytocoris* sec. spec. typ.). *Capsus pinetellus* KIRSCHB., Rhynch. Wiesb. p. 76, 90. FLOR, Rhynch. Livl. I p. 586, 69. *Agalliastes lugubris* FIEB., Eur. Hem. p. 312, 10 ♂. *Plagiognathus pallidipennis* J. SAHLB., Not. Skpts pro F. et Pl. F. Förh. IX p. 178, 101 ♀.

På barrträd i Skåne, på Gotland, vid Stockholm och i Lappland.

21. *Ag. impurus* BOH., Ö. V. A. F. 1852 p. 69, 24 (*Phytocoris*) REUT., Not. Skpts pro F. et Pl. F. Förh. XIV p. 22, 39.

Funnen af BOHEMAN i Skåne och på Gotland.

\*22. *Timicephalus obsoletus* DOUGL. et SCOTT, Brit. Hem. p. 391, 1 (forte). Oblongus, virescenti-luridus, subtiliter pallido-pubescentis; oculis apiceque rostri nigris, tarsis apice fuscis; membrana dilute infuscata, iridescente, venis luridis, areolis pallidis. Long.  $4\frac{2}{3}$  m.m.

*Femina*: Vagina medium abdominis attingente.

Funnen i Östergötland af HAGLUND.

Corpus oblongum, pallido-pubescentis. Caput 5-angulare, subtiliter pallido-hirsutulum, luridum, breve, basi longitudine fere dimidio latius, vertice haud carinato, fronte convexa; tylo utrinque æquilato, a fronte linea impressa distincte discreto, basi in linea media interoculari sita; gula brevi. Oculi sat magni, rotundati, lateribus capitis parum breviores, margine anteriore apicem versus paullo divergentes, nigri; intervallum oculorum latitudine oculi fere  $2\frac{1}{2}$  latius (♀). Antennæ prope marginem oculorum anteriorem inferne insertæ, luridæ,  $\frac{2}{3}$  corporis longitudine, articulo primo dimidii capitis longitudine, secundo hoc quadruplo longiore, lineari, duobus ultimis simul sumtis æquilongis, tertio quarto plus duplo longiore. Rostrum coxas posticas vix attingens, virescenti-luridum, apice summo nigro, articulo primo crassiore capite paullo superante. Pronotum breviter trapezoidale, flavo-luridum, subtiliter pallido-pubescentis, margine antico recto longitudine sub-æquilatum, margine postico leviter rotundato quam apice circiter  $\frac{2}{3}$  latius, lateribus rectis (♀). Hemelytra lurida, satis pellucida, sat nitida, subtiliter pallido-pubescentia, abdomen fere  $\frac{1}{4}$  longitudinis superantia, basi pronoti  $3\frac{2}{3}$  longiora, margine anteriore leviter rotundata, cuneo basi paullo longiore. Membrana leviter infuscata, iridescentis, areolis pallidioribus, venis luridis. Pedes dilute luridi vel virescentes, coxis posticis epipleura hemelytrorum haud attingentibus, femoribus posticis breviusculis, sat robustis, tibiis omnibus longius pallido-spinosis, aroliis sat magnis, subparallelis. Abdomen leviter fuscens vel luridum, vagina femine medium attingente.

\*23. *Oncotylus pulchellus* n. sp. Ovalis, totus flavo-luteus, tantum oculis et apice tarsorum brunneis; supra nigro-pilosus parciusque albo-tomentoso-pubescentis; membrana leviter infuscata, macula parva sub apice cunei hyalino-albida, venis areolisque pulchre flavis (♀). Long.  $3\frac{1}{2}$  m.m.

Funnen vid Stockholm af BOHEMAN.

*Onc. fenestrato* FIEB. simillimus videtur, supra longius nigropilosus, tibiarum spinis pallidis distinguendus. Corpus ovale (♀), aurantiaco-vel luteo-flavescens. Caput basi longitudini subæquilongus, subverticale; vertice basi marginato; tylo elevato, basi a fronte distincte discreto; gula brevi. Oculi mediocres, granulati, nigri, margine interiore apicem versus divergentes; intervallum oculorum latitudine oculi quadruplo latius. Antennæ prope marginem oculorum interiorum inferne insertæ,  $\frac{3}{4}$  corporis longitudine, articulo primo dimidio longitudinis caput superante, duobus ultimis simul sumtis secundo subæquilongis, quarto tertio fere triplo brevior. Rostrum coxas intermedias attingens, apice brunneo. Pronotum breviter trapezoidale, apice longitudine paullo latius, basi longitudine circiter triplo latius, marginibus acutis, disco antico linea impressa transversali notato. Scutellum triangulare, apice albido. Hemelytra pronoto plus quintuplo longiora; cuneo margine exteriori corio plus triplo brevior. Membrana supra in diagnosi descripta. Pedes flavi, tibiis pallido-spinulosis, apice summo tarsorumque apice nigris; coxis posticis epipleura hemelytrorum haud attingentibus. Vagina feminæ medium abdominis attingens, squama sat magna.

\*24. *Macrocoleus aureolus* FIEB., Eur. Hem. p. 320, 4. *Capsus Tanacetii* THOMS. (nec FALL.), Opusc. ent. IV p. 450, 115 (verisimiliter).

Tagen af BOHEMAN i Vestergötland. Går troligen genom hela södra Sverige.

\*25. *Amblytylus nasutus* KIRSCHB., FIEB. Eur. Hem. p. 319, 5 (sec. determ. FIEBERI).

Funnen på Öland och Gotland af BOHEMAN.

Species mihi ignotæ, in Suecia captæ:

*Phytocoris pallidulus* DAHLB., *Lopus oculatus* DAHLB.