

- b. Antennæ breves, articulo secundo apicem versus sat fortiter incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo parum longiore. Rostrum articulo primo caput superante. Niger, subtus griseo-sub-pruinosus, opacus, pallido-pubescent. Antennæ nigrae. Rostrum nigrum, nitidum. Caput nigrum, utrinque macula verticis aliaque supra insertionem antennarum luridis. Pronotum fusco-testaceum vel luridum, marginibus omnibus, strictura apicali callisque, lateribus vittisque tribus disci postice abbreviatis, lateralibus latioribus, nigris, disco transversim fortiter rugosum. Scutellum nigrum. Hemelytra fusco-testacea, commissura, sutura clavi venisque corii nigris, cuneo aurantiaco, apice anguste nigro. Membrana venis aurantiacis, extus fusco-marginatis, areola minore marginaque externo late fuscis. Coxæ nigrae. Trochanteres testacei. Femora ferruginea, basi ira nigra. Tibiae ferrugineæ, apicem versus nigrae, nigro-spinosæ. Tarsi nigri. Corpus supra, antennæ et pedes dense nigro-pilosa. Long. $7\frac{1}{2}$ m.m. Habitat in alpibus Noricis ad Nassfeld (5000''), D. A. PALMÉN. *C. (P.) Palméni* REUT. n. sp. (Mus. Helsingfors.)
- bb. Antennæ corporis longitudine, articulo secundo apicem versus leviter incrassato. Rostrum articulo primo caput haud superante. *C. (P.) striatus* L.
- aa. Antennæ longæ, articulo ultimo penultimo breviore. Pronotum strictura apicali flava. *C. (P.) marginellus* F. (*Homodemus marginellus* FIEB.)
- AA. Gula haud distingvenda. Caput breve, verticale. Clypeus parum prominens. Antennæ in medio marginis oculorum interne insertæ, articulis duobus ultimis secundo crassitie æqualibus, ultimo penultimo plus $\frac{1}{3}$ breviore. Subg. 4 *Megacoelum* FIEB.