

- 2(3). *Muco prostethii* medio subtiliter longitudinaliter canaliculatus. Caput fere verticale. Gula distincta, obliqua. Clypeus a fronte impressione distincta discreta, prominens. Rostrum coxas posticas superans, articulo primo apicem mucronis attingente. Femora postica incrassata. Tibiae nigro-punctatae, tenuiter pallido-spinulosæ. Tarsi postici articulo tertio secundo haud longiore. Gen. 1. **Solenoxyphus**. (= *Macrocoleus lepidus* FIEB., PUT.)
- 3(2). *Muco prostethii* haud canaliculatus.
- 4(5). Tibiae et femora punctata. Rostrum coxas posticas superans, articulo primo apicem mucronis attingente. Gula obliqua. *Muco prostethii* convexus, crassus. Mesosternum apice truncatum. Tarsi articulo secundo tertio longiore. Corpus supra pilis fragilibus nigris. Gen. 2. **Pachyxyphus** FIEB.
- 5(4). Tibiae haud nigro-punctatae.
- 6(7). Caput latum, pronoti basi tantum $\frac{1}{3}$ angustius, nutans. Rostrum coxas posticas attingens, articulo primo apicem mucronis attingenti. Clypeus a fronte distincte discretus, prominens. Gula sat brevis, haud vel vix obliqua. Antennæ articulo primo apicem clypei haud attingente. Mesosternum apicem versus convexum, apice medio truncatum. Corpus supra pilis nigris facillime divellendis. Gen. 3. **Hadrophyes** (FIER.) PUT.
- 7(6). Caput pronoto basi duplo angustius, nutans. Gula obliqua. Pronotum lateribus apicem versus sat fortiter angustatum, callis disci discretis. Rostrum coxas posticas superans, articulo primo apicem mucronis haud attingente. Mesosternum margine apicali medio truncato. Corpus supra dense nigro-hirsutum. Gen. 4. **Hoplomachus** FIEB., REUT.
- A. Clypeus prominens. Prostethii mucro planus. Pronotum callis discoloribus. Rostrum articulo primo dimidium mucronis attingente. Coxæ anticae breves, medium mesosterni postice parum convexioris haud attingentes. Subg. 1. **Hoplomachus** FIEB. Conspectus specierum:
- a. Ovatus. Caput pallidum, maculis duabus frontis basique clypei nigris, nitidis. An-