

ante apicem foreolatum. Metasternum brevissimum.  
Gen. 8. **Achenocrepis** FIEB. (*A. Schjödtei* STÅL  
1854 = *Foreli* MULS. 1856.)

- 17(16). Pronotum lateribus rectis vel leviter rotundatis.
- 18(19). Tarsi postici articulo tertio longo, duobus primis simul sumtis fere longiore. Caput fere verticale. Oculi feminæ latissime distantes. Rostrum coxas intermedias attingens vel paullo superans, articulo primo caput haud vel parum superante. Mesosternum apice medio emarginatum. Metasternum leviter convexum. Tibiæ haud nigro-punctatæ, sed nigro-spinulosæ. Unguiculi magni. Gen. 9. **Megalodactylus** FIEB., REUT.
- A. Gula distincta. Clypeus basi fere in linea inter bases antennarum ducta posita. Oculi minus fortiter granulati. Tibiæ basi nigræ. Subg. 1. *Megalodactylus* FIEB.
- AA. Gula haud distingvenda. Clypeus latiusculus, a latere visus deorsum et retrorsum flexus. Caput breve. Oculi fortiter granulati. Tibiæ totæ palpidæ vel virescentes. Subg. 2. *Tuponia* REUT. Ad hoc subgenus referendi: *Psallus Tamarisci* PERR (= *notatus* FIEB.), *Oncotylus hippophaës* MEY. et
- M. (T.) Lethierryi* REUT. n. sp. Virescenti-flavus, supra flavescentes. Frons maris oculo magno brunneo fortiter granulato fere dimidio latiore. Clypeus basi supra basin antennarum posita. Antennæ dimidio corpore paullo longiores, crassiusculæ, articulo secundo primo circiter  $4\frac{1}{2}$  longiore, 3:tio 2:do circiter  $\frac{1}{4}$  breviorn, 4:to 3:tio plus duplo breviore. Pronotum basi quam apice duplo latius. Scutellum albido-flavescentes, basi detecta rufo-testacea (in specimine descripto (an semper?) frenulo elevato arcuato transversali instructo), angulis basalibus nigris, disco vitta media angusta longitudinali ochracea. Hemelytra abdomine parum longiora, rufescenti-testacea, clavo apice fusco, corio limbo externo cuneoqve albidis, corio apice cuneoqve macula disci oblonga rubris. Membrana dilute fumata, venis rubris, areola minore obscurius