

PETITES NOUVELLES ENTOMOLOGIQUES

Paraissant le 1^{er} et le 15 de chaque mois

ABONNEMENT ANNUEL :

France et Algérie.....	4 fr. »
Belgique, Suisse, Italie.....	5 »
Tous les autres pays.....	6 »

(AFFRANCHISSEMENT COMPRIS).

ADRESSER LE MONTANT DES ABONNEMENTS

Et tout ce qui est relatif à la Rédaction et à l'Administration

A. M. E. DEYROLLE FILS, NATURALISTE
23, rue de la Monnaie, PARIS.

Les Souscripteurs qui demeurent à l'étranger peuvent nous faire parvenir le montant de leur souscription en timbres-poste neufs de leur pays et de valeur moyenne; de un ou deux pence d'Angleterre; de deux ou quatre krountzor d'Autriche; de vingt ou trente centimes pour la Belgique, la Suisse et l'Italie, etc., etc., etc.

DIAGNOSES PRÆCURSORIÆ

Hemipterorum-Heteropterorum

AB O.-M. REUTER.

1. — Genus **ALLORHINOCORIS** : Corpus magnum, vertice sulco longitudinali tenui, sed profundo; fronte haud producta, apice truncata; clypeo toto prominente; oculis pronoti angulos fere attingentibus; pronoto strictura apicali, lateribus antice marginato; tarsis articulo primo secundo brevior. Ad divisionem *Miraria Capsidarum* referendus et generi *Pantilio* CURT. affinis, notis supra datis bene distinctus.

A. prasinus FIEB. ? (*Conometopus*, id. Dodec., 16, 3) : Virescens, opacus, supra dense et brevius adpressim pilosus; colore capitis, partis anterioris pronoti, scutelli, antennarum femorumque in testaceum vergente, margine corii externo, femoribus supra tibiisque apice ferrugineis, tarsis rostroque apice nigro-fuscis; membrana nigricante, vel dilute virescenti-hyalina, opaca, venis viridibus, extus viridi-marginatis. Long. : ♂ 9 1/2, ♀ 8 2/3 millim. Russia merid.

2. — **Phytocoris Jakovleffi**, n. sp. : Supra testaceus, purpureo-variegatus, nigro-pilosulus, brevius et parce albo-intricato-pubescent, hemelytris margine scutellari, sutura clavi, linea obliqua media corii apiceque cunei fusco-purpureis, membrana venis lacte purpureis; capite sat fortiter nutante, fronte convexiuscula, declivi, clypeo basi impressione minus profunda discreto; antennis testaceis, articulo primo fusco-variegato et pronoto distincte longiore, sat tenui, ultimis conjunctis secundo longioribus; pedibus pallido-testaceis, femoribus longis, posticis apicem versus fusco-variegatis, tibiis anterioribus fusco-triannulatis, posticis tantum basi latius fuscis. Long. : ♂ 5 1/2 millim. Species pulcherrima a *Ph. ulmi* L. (divergente Mey) pilositate corporis cuneoque basi

haud albido, a *Ph. Novickyi* FIEB. colore tibiarum posticarum mox distinguenda. Hab. in Sarepta. D^r JAKOVLEFF.

3. — **Phytocoris insignis**, n. sp. : Sordide ochraceus, nigro-pilosus et parcius pallido- et albo-intricato-pubescent, pronoto parte posteriore infuscata, hemelytris vittis obliquis fuscis, venis omnibus pallidis, corio apice macula elongato-triangulari pallido-ochracea, cuneo obscurius ochraceo, angulo interno albicante, fusco-conspurcato, vitta media longitudinali, sutura membranæ apiceque pulchre aurantiaco-rubris, membrana venis omnibus ochraceis; antennis testaceis, articulo primo pronoto longitudine æquali, minus incrassato; capite leviter nutante, fronte sub-horizontali, apice truncata, clypeo basi impressione profunda bene discreto, prominente; segmento maris genitali margine superiore aperturæ medio processu biramoso instructo. Long. : ♂ 7 2/3 millim. Hab. in Caucaso. D^r JAKOVLEFF.

4. — Genus **SAUNDERSIA** : Corpus oblongo-ovatum, supra remote pubescens, capite verticali, pronoti basi circiter duplo angustiore, vertice deplanato, nitido, ad oculos utrinque stria abbreviata impressa, clypeo basi cum fronte confluyente, ne minime quidem prominente, gula obliqua sat brevi; antennis articulo primo clypei apicem vix superante, secundo fere simpliciter; pronoto impresso-punctato, strictura apicali opaca, basi apice fere duplo et dimidio latiore; tibiis spinulosis, pilosulis (*Capsaria*).

S. moerens, n. sp. : Niger, nitidus, supra breviter et parce flavo-pubescent, antennis articulo tertio basi, rostro medio, femorum (saltem anticorum) basi et apice tibiisque ferrugineis, his basi piceis, apice tarsisque nigris, marginibus acetabularum orificiisque albis. Long. : 6 millim. Hab. in Græcia. D^r SAUNDERS.

5. — **Orthocephalus tenuicornis** MULSANT et REY (*Opuscula entomologica*, I, p. 152), a D^{ro} PUTON (*Catalogus Hemipterorum*, 1875) ut synonymon *O. saltatoris* HEHN cita-