

<i>Fairmairei</i> , Leprieur.	Corse.
— <i>vestitus</i> , Fairm., Ann. Fr., 1859, p. 27.	—
— ? <i>opatrinus</i> , Aubé, Icon. et sp.	France mérid.
<i>Mæstus</i> , Fairm. (ex typis), Ann. Fr., 1859, p. 272.	Corse.
<i>Inconspicetus</i> , Lep.	Alsace et France mérid.
<i>Bombycinus</i> (Reich. in Mus.), Lep.	Algérie.
<i>Aubei</i> , Mulsant., Ann. soc. Lyon, VI, 1843, p. 276.	France mérid.
— <i>semi-rufus</i> , Germ., Fr. Ins. Eur., 23.	—
— var. <i>Delarouzei</i> , Jacq. Duv., Ger., p. 34.	—

MON CHER COLLÈGUE,

Puisque vous voulez bien accorder l'hospitalité des *Petites Nouvelles* à mon synopsis des hydropores du groupe de l'*Opatrinus*, je vous demanderai la permission d'en dire ici quelques mots.

Ces espèces, si distinctes qu'elles puissent être, ont été comme à plaisir confondues à ce point que je n'ai pas vu à Paris une seule collection où elles ne fussent mélangées, et je suppose que partout il doit en être de même; et pourtant leurs caractères différentiels sont si frappants qu'il m'est impossible de comprendre comment ils ont pu échapper à des observateurs tels que Schaum ou Aubé.

La forme du corselet, celle de ses côtés ou de ses angles postérieurs, la présence ou l'absence de la dépression latérale, combinés avec quelques autres signes de moindre importance, offrent en effet le moyen le plus facile de séparer les unes des autres les diverses espèces de ce groupe.

Comme je n'ai pas sous les yeux tous les types, je n'oserais affirmer que je n'ai pas commis quelque erreur de dénomination, mais je puis assurer de la manière la plus nette que les quatorze espèces comprises dans le synopsis sont bien distinctes, comme tous les entomologistes pourront le reconnaître en tenant compte des données qui ont servi de base à mon travail.

Leprieur.

DIAGNOSES PRÆCURSORIÆ

Hemipterorum-Heteropterorum

AB O.-M. REUTER.

1. — Gen. **BOTHROCRANUM** nov. : Corpus oblongo-ovatum, supra subtilissime et parce pubescens, capite fortiter nutante, longitudine vix latiore, vertice margine postico acute carinato, carina medio subtiliore, lateribus crassiore et antice ad oculos utrinque fovea sat magna determinata, disco verticis medio impressione distineta, clypeo a fronte impressione discreto, areuato, gula brevi; oculis oblongis; rostro coxas medianas attingente, sat robusto, geniculato, articulo primo apicem clypei paullo superante; antennis ad apicem oculorum interne insertis; pronoto callis bene discretis, mox pone marginem apicalem linea transversa illi parallela instructo, disco postico convexo-declivi, transversim ruguloso, basi apice paullo magis quam duplo latiore, hoc capite paullulum angustiore; scutello basi detecto, apicem versus transversim rugoso; hemelytris dense et subtiliter sub-ruguloso-punctatis, completis, membrana biareolata; alis areola unco destituta; xynho prosterni lateribus mar-

ginato; tibiis subtiliter spinulosis, aroliis conniventibus (*Capsidæ*, div. *Cyllocoraria*, prope gen. *Loxops* locandum).

B. Freyi n. sp. : Piceo-nigrum, nitidum, subitus subtiliter flavicantipubescentis, supra sub-glabrum, soutello hemelytrisque pilis cupris divellendis parcius pubescentibus, his æneo-nitentibus, antennam articulo primo pedibus rufo-testaceis, illo apice femoribus sepa magis minusve infuscatis, tibiis apice tarsisque fuscis, rostro fuscens-testaceo. Long., 5 millim. Hab. in Helvetia (Engaddin). Dr KILLIAS.

2. — Gen. **PHENICOCARSUS** nov. : Corpus ovatum, parum convexum, longius pilosum; capite nutante, apicem versus longius rostrato-producto, gula recta, sat brevi, clypeo a latere visu margine externo sat fortiter arcuato, genis humilibus; antennis ad apicem oculorum interne insertis, corpore (hemelytris exceptis) circiter dimidio brevioribus, articulo primo apicem clypei fere attingente, secundo duobus ultimis conjunctim longitudine æquali; rostro coxas intermedias attingente, articulo primo caput parum superante; pronoto trapeziformi, lateribus margine acuto, ante angulos posticos levissime sinuatis, his late rotundatis et nonnihil (præsertim in foemina dilatatis, margine basali inter angulos recto, apice profundius emarginato, callis disci discretis; hemelytris completis, membrana biareolata; xynho prosterni marginato et apicem versus concavo; tarsis posticis articulo tertio duobus primis conjunctim longitudine fere æquali, secundo primo longiore (Prope *Macrocoleum* FIEB.).

Ph. regina, n. sp. (♀) : Supra purpureo-rufus, longius pallido-pilosus, macula obsoletiore frontis et margine postico verticis, pronoto limbo antico, hoc ipso margine purpureo, lateribus, vitta disci sat lata media marginaque postico, scutello macula basali utrinque vitta media in parte apicali valde dilatata neenon hemelytris vena clavi percurrent, sutura clavi, vena cubitali corii anguste, embolio toto, marginibus cunei venisqué membranæ flavis; capite punctis quatuor verticis in seriem transversalem positis punctisque tribus basis clypei neenon punctis nonnullis marginum callorum pronoti nigris; subtus niger, marginibus acetabularum, orificiis marginibusque segmentorum ventralium lateribus flavis, ventre apicem versus aurantiaco-rubo: pedibus rufis, tibiis nigro-spinulosis, apice tarsisque nigro-fuscis. Long., 4 1/4 millim. Hab. in Hispania. D. STAUDINGER (Mus. Berolinense).

3. — **Macrocoleus** MELLÆ, n. sp. : Aurantiaeo-flavus, supra dense et longius flavo-pilosus, subtus pallido-pubescentis, femoribus præsertim posticis seriebus duabus punctorum dilute fusciscentium notatis, supra apice punctis fusciscentibus nonnullis; tibiis spinis validis fuscis, tarsis apice infuscatis; hemelytris unicoloribus, venis membranæ flavis; vertice oculo circiter duplo et dimidio latiore (♀). A *M. chrysotricho* FISS. statuta robustiore, æminæ fronte nonnihil latiore, femoribus saltim posticis seriatim fusciscenti-punctatis tibialis spinulis validioribus fuscis distinctus. Hab. in Italia, D. Com. C. MELLA.

4. — **Plagiognathus plagiatus** n. sp. : Supra obscurius fulvo — (♂) vel griseo — (♀) testaceus, dense nigro — pilosulus, opaculus, capite apice et annulo lato frontis pronotoque fascia antica vel tantum callis nigris vel fuscis; antennis articulis duobus primis nigris, ultimis fuscis — testaceis; scutello, basi lineaque media exceptis, fusciscenti; corio plaga discoïdali fusa, venis hemelytrorum basique cunei pallidioribus; membrana sumata, venis fulvis vel albidis, areolis totis infuscatis; femoribus seriatim nigropunctatis, tibiis spinulis nigris e punctis minutis nigricantibus nascentibus, basi nigra; apice tibiarum tarsisque fusa. A *Pl. arbustorum*, cui magnitudine similis, femoribus haud nigro-marginalis, venis membranæ totis fulvis vel albidis tibiisque punctis minusculis differt; a *Pl. obscuricaprile* STAL, cui colore maxime affinis, corpore multo majore et magis opaco, fronte opaculo, haud toto nigro pedibusque nigro-pubescentibus distinguendus; a *Pl. fulvipennis* KIRCH. capite ad magnam partem nigro, membrana obscure infuscata picturaque pronotum et hemelytrorum distinctus. Hab. in Italia, D. Com. C. A. MELLA.

5. — Gen. **XYLOCORIDEA** nov. : Corpus elongatum, depresso, capite inter antennas longius producio, oculis fere in medio capitis laterum positis; antennis tenuibus, pilosulis, articulo primo apicem capitis attin-