

genitale subtus carina obtusa sed altius elevata instructum. Terebra feminae medium ventris superans.

1. *Megalodactylus macula rubra* MULS. et REY.

Tab. II, fig. 7.

Diagnosis: Pallido-virescens vel pallide flavo-testaceus, subtilissime vix visibiliter pallido-pubescent, nitidus; antennis (δ) fere fuscescenti- vel (Ω) pallido-testaceis, articulo primo basi vel toto summaque basi articuli secundi piceo-nigris; tibiis nigro-spinulosis, basi superne nigra; hemelytris albido-testaceis, clavo plaga latiore media fusca, corio apice fascia latiore lateritio-rubra; membrana infuscata, venis pallidis. Long. 4 mm.

Syn.: *Capsus macula rubra* MULS. et REY., Ann. Soc. Linn. de Lyon 1852, p. 138! FIEB., Eur. Hem. 297, 1!

Hab. in Tamarice: Europa meridionalis.

Descr.: Corpus pallido-virescens vel pallide flavo-testaceum, nitidum, subtilissime vix visibiliter pallido-pubescent. Caput pallido-testaceum vel interdum fuscescent; apice testaceo, glabrum, nitidum, vertice oculo fere duplo (δ) vel paullo magis quam duplo (Ω) latiore. Oculi fusci. Rostrum pallido-testaceum, apice nigrum. Antennae testaceae, maris sub-fuscescentes, feminae pallidae, articulo primo basi vel toto summaque basi articuli secundi piceo-nigris, articulo secundo maris crassiusculo, feminae graciliore. Pronotum pallido- vel virescenti-testaceum, nitidum, sub-glabrum. Scutellum pallide virescens vel pallido-testaceum, basi nonnihil ochraceum. Hemelytra albo-testacea, clavo plaga media sat lata fusca vel fuscescente, corio macula vel fascia apicali latiore lateritio-rubra, marginibus interdum fuscescentibus; membrana obscure infuscata, iridescente, venis albo-testaceis, areolis limbo externoque fuscis. Abdomen dorso nigro. Pedes virescentes vel pallido-testacei, tibiis nigro-spinulosis, basi supra nigra, tarsis articulo ultimo summo apice unguiculisque fuscis.

Gen. IV. **ASCIODEMA** REUT.

Tab. I, fig. 4.

Tinicephalus p. FIEB., *Psallus* p. FIEB.

Diagnosis: Corpus oblongum (δ) vel oblongo-ovatum (Ω), longius et densius pubescens, capite transverso, verticali vel fortiter nutante, vertice aequali, clypeo parum vel vix prominente, leviter arcuato et a latere viso angusto, basi cum fronte confluente et in linea intermedia oculorum posita; oculis granulatis, pronoto contiguis; rostro coxas posticas attingente vel paullo superante, articulo primo sat dilatato; pronoto brevi, lateribus rectis, callis magis minusve discretis; pedibus totis concoloribus, femoribus punctis nigris