

Var. α: Niger, hemelytris nonnihil purpurasceni-micantibus, antennis, apice femorum, tibiis tarsisque luteis.

Var. β: Fusco-purpurascens vel purpurascens, etiam femoribus, summo apice excepto, purpureis; tibiis basi subtus sat late purpurascente; cetero ut *var. α*.

Hab. in *Pini sylvestri* Sveciae!, et Fenniae!, Rossiae, Germaniae!, Helvetiae! et Galliae!

Deser.: Corpus ovatum, nitidum, nigrum, fusco-purpurascens vel purpurascens, supra subtiliter griseo-pubescentia, praesertim in hemelytris squamulis argenteis vel pallide aureis faciliter divellendis sat remote ornatum, subtus sub-glabrum. Caput fortiter nutans, longitudine paullo latius, basi pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius, clypeo cum fronte omnino confluente, depresso, ne minime quidem prominente, vertice oculo circiter $\frac{2}{3}$ ($♂$) vel fere duplo ($♀$) lato, postice marginato vel saltem margine acuto, gula brevissima. Rostrum piceum, coxas posticas attingens, articulo primo caput paullo superante. Antennae dimidio corpore (cum hemelytris) breviiores, luteae, articulo secundo latitudine capitidis parum longiore, maris crassiusculo, feminae gracili, tantum apice paullulum latiore, duobus ultimis simul sumtis secundo longitudine aequalibus, quarto tertio paullo breviore. Pronotum trapeziforme, latiusculum, apice longitudine circiter dimidio, basi longitudine circiter duplo et dimidio latius, apicem versus parum declive, disco postico distincte subtiliter transversim sub-ruguloso-strigoso, nigrum vel purpurascens, subtiliter griseo-pubescentia, lateribus pilis nonnullis nigris longioribus sub-exsertis. Scutellum sub-laeve. Hemelytra abdomine longiora, nigra vel purpurascens, squamulis argenteis vel pallide aureis faciliter divellendis parce ornata, subtiliter griseo-pubescentia; membrana infuscata, iridescente, areolis paullo obscurioribus, venis piceis vel rufo-piceis, macula parva ad apicem cunei hyalina. Pectus et abdomen nigra vel purpurea, glabra, nitida. Coxae nigrae vel purpurascentes. Femora nigra vel purpurascens, apice lutea; postica fortiter incrassata. Tibiae luteae, punctis nullis, saepe basi subtus sat late purpurascente, spinulis nigris armatae. Tarsi tenues, sat longi, lutei, articulo ultimo fuscescente.

2. *Sthenarus pusillus* REUT.

Diagnosis: Nigro-piceus, flavo-pubescentia, hemelytris dilutius piceis, rufescientibus, antennis pedibusque flavis, femoribus posticis praesertim marginibus guttulis nigris ornatis, tibiis spinulis nigris e punctis minutis nigris nascentibus. Long. $♂$ $1\frac{2}{3}$ mm.

Hab. in Italia meridionali (Napoli!), D. SAUNDERS.

Deser.: Corpus nigro-piceum, supra subtilius pallido-pubescentia. Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{3}$ angustius, nigro-piceum, vertice margine basali pallidulo, sub-acuto, oculo circiter duplo et dimidio latiore ($♂$). Rostrum flavum, coxas medias attingens, articulo primo capitidis longitudine, nigro-fusco. Antennae flavae, articulo secundo crassi-