

corpore tantum circiter $\frac{1}{4}$ (σ) vel fere duplo (φ) breviores, albido-flavae, articulo primo annulo tenui basali punctisque duobus interiobus, altera superiore, altera inferiore, ante apicem positis nigro-fuscis, articulo secundo latitudini pronoti basali longitudine aequali (σ) vel hac circiter $\frac{1}{4}$ brevior (φ), maris leviter crassiusculo, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo longitudine aequalibus. Pronotum unicoloriter dilute flavescens vel virescens, angulis posticis maculaque disci pone medium dilute fusciscenti-flavescentibus; saepe albido-flavescens, marginibus omnibus callisque flavescens. Scutellum albido-flavescens, saepe vitta longitudinali virescente, interdum totum pallide flavescens, semper summo apice nigro. Hemelytra albida, clavo macula anguli scutellaris, corio maculis tribus interioribus in seriem positis, quarum prima fere ad medium suturae clavi et ultima ad angulum basalem internam cunei positae, maculaque majore mox ante angulum apicalem externum, et cuneo macula magna externa dilute flavescens-fusciscentibus; his maculis interdum magis minusve obsoletis; clavo summo apice nigro; membrana hyalina, venis albis vel albido-testaceis, apice areolae majoris areolaeque minore fuscis, macula ad apicem cunei sat magna sub-opalina, postice a stria sat lata, leviter arcuata apicem areolae minoris attingente fusca terminata, hac stria ad apicem areolae cum arcu latiore fusco pone medium marginis externi membranae ad apicem areolae minoris usque ducto conjuncta, arcibus his duobus maculam magnam opalinam sub-rhombicam, basi leviter sinuatam, includentibus. Pedes flavescens-albidis, femoribus supra margine inferiore punctis duobus, altero prope apicem, altero fere in medio marginis positae, margine superiore punctis duobus, altero in ipso apice, altero prope apicem, nigris, atomisque nonnullis in seriem obliquam prope apicem positae nigro-fuscis, subtus margine inferiore punctis 5—6, margine superiore punctis nonnullis, quarum uno prope apicem posito majore setifero, disco fere in triente apicali puncto atomisque nonnullis nigris; tibiis spinulis pallidis, ad basin tibiarum versus fusciscentibus, e punctis nigris nascentibus; tarsis articulo ultimo apice unguiculisque fuscis.

Gen. XIII. MALACOTES REUT.

Tab. I, fig. 13.

Diagnosis: Corpus ovale, pubescens, pilis squamiformibus omnino destitutum, capite fere verticali, pronoti apice paullo latiore et ejus basi circiter $\frac{1}{3}$ angustiore, vertice immarginato, clypeo basi a fronte parum discreto, gula distinguenda; antennis articulo secundo latitudine capitis basali longiore; oculis apicem versus divergentibus, orbita interiore vix sinuatis, parum granulatis; pronoto breviter trapeziformi, lateribus sub-rectis; hemelytris formae hactenus cognitae abbreviatis apice sub-truncatis, tantum segmentum ultimum dorsalem haud tegentibus, membrana parva; femoribus posticis incrassatis, nigro-punctatis, tarsis posticis articulo tertio secundo longitudine aequali.

Habitat species unica hujus generis in Gallia meridionali.

Descr.: Corpus ovale, pubescens, pilis squamiformibus omnino destitutum, sub-opaculum. Caput fere verticale, pronoti apice paullo latius et ejus latitudine basali