

Coxae apice albae. Pedes sanguinei, femoribus interdum basin versus fuscis, tibiis e punctis nigris nigro-spinulosis, tarsis apice plerumque fuscis. Segmentum maris genitali longius carinatum, apicem versus subtiliter strigosum.

9. *Psallus chrysopsilus* REUT.

Diagnosis: Nigro-fuscus, opacus, supra dense fusco-pilosus, pilis subtilibus aureis micantibus faciliter divellendis parcius inaequaliterque pubescens, antennis nigris, articulis ultimis nonnihil fuscescentibus et simul sumtis secundo longitudine aequalibus, quarto tertio circiter $\frac{2}{5}$ brevior (♂), vel fusco-testaceis, articulis ultimis conjunctim secundo paullulum longioribus, quarto tertio circiter $\frac{1}{3}$ brevior, apice testaceo (♀); pedibus sordide et pallide albido-fuscescentibus, femoribus subtus obsolete seriatim nigro-punctatis, supra apice atomis nigris minus distinctis conspersis, tibiis nigro-fusco-punctatis, nigro-spinulosis, tarsis articulo ultimo fusco-nigro; rostro coxas posticas sat superante; orificiis metasterni fuscis; hemelytris fuscis, membrana nigricante areolis concoloribus, venis testaceis vel vena brachiali nigro-fusca; vertice oculo circiter duplo (♂) vel fere $2\frac{2}{3}$ (♀) latiore; segmento maris genitali subtus carinato. Long. ♂ $3\frac{1}{2}$, ♀ 3 mm.

Hab. in Hungaria, D. Dr v. HORVATH.

Descr.: Species brevitate pronoti, pubescentia aurea subtili, colore antennarum et pedum bene distincta. Femina *Psallo Laricis* (FREY) REUT. sat similis, clavo et corio unicoloribus et aliter pubescentibus, rostro longiore pedumque colore mox distinguendus. Corpus fusco-nigrum, opacum, supra dense nigro-pilosulum, pilis subtilibus aureis micantibus inaequaliter et parce pubescens, subtus pallido-pubescens. Caput clypeo basi a fronte impressione discreto, gula vix vel haud distinguenda, vertice oculo circiter duplo (♂) vel fere $2\frac{2}{3}$ (♀) latiore; fusco-nigrum, lateribus saepe fuscum vel fusco-testaceum. Rostrum coxas posticas sat superans, fusco-testaceum, articulo primo testaceo. Oculi ferruginei. Antennae corpore cum hemelytris circiter $\frac{1}{4}$ breviores, maris nigrae, articulo secundo primo fere quadruplo longiore, aequaliter nonnihil fortius incrassato, ultimis tenuibus, conjunctis huic longitudine aequalibus, parum dilutioribus, tertio secundo circiter $\frac{1}{3}$ brevior, quarto tertio circiter $\frac{2}{5}$ brevior; feminae obscure fusco-testaceae vel fere fuscae, articulo secundo duobus ultimis conjunctim distincte brevioribus, tertio secundo circiter $\frac{1}{4}$ brevior, quarto tertio circiter $\frac{1}{3}$ brevior apice testaceo. Pronotum breve, capite supra viso fere brevius, basi longitudine fere $2\frac{1}{2}$ latius. Hemelytra fusca, unicolora vel basi cunei latius pallidior, corio et cuneo apicem versus colore in sanguineum leviter vergente (♀), membrana nigricante, areolis totis concoloribus, venis vel omnibus testaceis (♀) vel vena brachiali fusco-nigra (♂), pone apicem cunei macula hyalina. Metasternum macula laterali testacea (♀), orificiis fuscis, opacis. Pedes obscure fuscescenti-albidi vel sordide fuscescenti-testacei, femoribus subtus punctis obsoletis seriatim nigris, supra apice atomis collocatis nigro-fuscis, minus distinctis; tibiis nigro-spinulosis, spinulis e punctis nigro-fuscis nascentibus; tarsis posticis gracilibus, articulo tertio secundo longiore, fusco-nigro. Segmentum maris genitale subtus carina longitudinali instructum.