

Rostrum testaceum, coxas posticas longe superans, articulo ultimo fere toto fusco. Oculi nigri, fortius granulati. Antennae flavo-testaceae, pilosulae, articulo primo innotato, secundo ultimis simul sumtis paullo breviore (σ) vel longitudine aequali (φ), articulo tertio secundo circiter $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{4}$ breviore et quarto tertio circiter duplo (φ) vel $\frac{3}{7}$ — fere $\frac{1}{3}$ breviore (σ), articulis ultimis interdum obscuris. Pronotum opaculum, fuscum. Scutellum fuscescens, sub-nitidum, callo basali utrinque rufo-ferrugineo. Hemelytra unicolora, fusco-testacea, nitidula, cuneo basi magis minusve late albido, apice sub-concolore, membrana dilute infuscata, venis testaceis, areolis fere totis pellucidis, macula pone apicem cunei sat magna albo-hyalina, postice obscure marginata. Pedes albido- vel flavo-testacei, femoribus parce dilute fusco-punctatis, tibiis e punctis fuscis nigro-spinulosis, anticis spinis subtilibus et brevioribus, testaceis, tarsis posticis articulo tertio duobus primis simul sumtis longitudine aequali vel sub-aequali. Segmentum maris genitale subtus carina subtili instructum. Variat interdum pallidior, rufesceni-testaceus.

30. Psallus Piceae REUT.

Diagnosis: Pallido-testaceus, oblongus, parum nigro-pilosus et tenuiter, sed sat longe pallide flavo-pubescent, pilis his faciliter divellendis, capite majusculo, antennis pedibusque concoloribus, illis subtiliter pilosulis, articulo secundo duobus ultimis simul sumtis longitudine fere aequali, quarto tertio circiter $\frac{1}{3}$ breviore; femoribus parce fusco-punctatis, tibiis anticis subtiliter et saepe testaceo-spinulosis; hemelytris plerumque colore leviter in rubidum vergente, cuneo apice concolore, membrana parum signata; vertice oculo duplo (σ) vel fere duplo et dimidio (φ) latiore; maris segmento genitali subtus acute et alte carinato. Long. $3\frac{1}{2}$ — 4 mm.

Syn.: *Capsus varians* pars MEY., Stett. Ent. Zeit. II, p. 84, 2. (1841)? H. SCH., Wanz. Ins. VI, 25, fig. 603? MEY., Rh. Schw. 69, 39?*)

Var. β : Apice clavi corioque postice sub-fasciatim nigricantibus; vertice oculo vix magis quam duplo latiore. φ .

Hab. in *Pino Picea* et *sylvestri*: Helvetia!, D. MEYER-DUER.

Descr.: A *Ps. variante* (MEY.) H. SCH. structura capitidis, tibiis anticis multo subtilius et plerumque testaceo-spinulosis, tarsis posticis aliter constructis divergens. A *Ps. diminuto* KIRSHB. corpore paullo majore, structura capitidis et tarsorum segmentoque genitali maris subtus carinato distinctus. Corpus utriusque sexus oblongum, sub-parallellum, pallido-testaceum, parum nitidum, supra parce nigro-pilosulum, longius tenuiter albido- vel pallide flavo-pubescent. Caput majusculum, pronoti basi fere tantum $\frac{2}{5}$ angustius, vertice oculo circiter duplo (σ) vel fere duplo et dimidio (φ) latiore. Rostrum testaceum, coxas posticas minus longe superans, apicem versus fuscum. Antennae testaceae, articulo primo unicolora vel intus atomis duobus minutissimis setiferis fuscis,

*) „Auf und unter jungem Tannenwuchs“, MEY. l. c.; *Ps. varians* FIEB. et auct. recent. in Quercetis vel Salicetis occurrit.