

nigrante maculam rotundatam et hyalinam includente. Pectus et medium ventris in mare fusca. Pedes testacei, femoribus parce nigro-punctulatis, posticis apicem versus magis minusve obscure rufescens, tibiis extus spinulis nigris e punctis nigris fere biseriatis nascentibus, tarsis articulo ultimo apice fusco. Segmentum genitale maris subtus obtuse longitudinaliter carinatum.

44. *Psallus atomosus* REUT.

Diagnosis: Pallide griseo-rufescens, supra pilis albidis faciliter divellendis pubescens, capite, pronoto hemelytrisque ubique atomis rufo-fuscis sat dense irregulariter irroratis, cuneo apice concolore, macula autem basali albo-hyalina innotata, membrana sub-hyalina, vena brachiali fusca; pedibus testaceis, femoribus subtus minute fusco-punctulatis, posticis apice obscurioribus, tibiis nigro-punctatis, pallido-spinulosis; segmento maris genitali subtus mutico. Long. ♂ $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{2}{5}$ mm.

Hab. in Sarepta! Rossiae meridionalis, D. JAKOVLEFF.

Descr.: Corpus supra pallide griseo-rufescens, pilis albidis divellendis pubescens, subtus testaceum. Caput latitudine basali pronoti fere duplo angustius (♂), punctis minutissimis verticis lineolisque transversalibus frontis rufo-fuscens, vertice *maris* (femina ignota) oculo circiter $\frac{3}{4}$ latiore. Rostrum coxas posticas vix superans, testaceum, apice piceum. Antennae corpore cum hemelytris fere duplo breviores, testaceae, articulo primo tantum basi vel fere toto fusco, secundo (♂) crassiusculo, latitudini basali pronoti longitudine sub-aequali, duobus ultimis simul sumtis huic longitudine aequalibus. Pronotum breve, margine postico longitudine basique capit is circiter duplo latius, atomis rufo-fuscis sat dense irregulariter irroratum. Scutellum atomis rufo-fuscis notatum vel fere unicolor. Hemelytra *maris* abdomen longe superantia, atomis rufo-fuscis densius et irregulariter, saepe annulatim positis irrorata, cuneo tantum basi intus macula albo-hyalina atomis destituta signato, membrana sub-hyalina vel levissime fumata, vena brachiali fusca, venis reliquis albidis, areolis vel totis vel tantum apice fuscis, pone apicem cunei macula hyalino-albida apicem areolae minoris attingente, postice late obscure fusco-terminata, margine membranae late dilutius fusco, macula marginis externi magis minusve dilatata hyalina. Pedes testacei, femoribus apice subtiliter sed sat dense fusco-punctatis, posticis apice obscuris, tibiis e punctis nigris testaceo-spinulosis, articulo ultimo tarsorum fuscenscente.

45. *Psallus Absinthii* SCOTT.

Diagnosis: Griseo- vel albido-testaceus vel griseo-albidus, opacus, dense et longius albo-pubescentis, pronoto, scutello hemelytrisque atomis nigro-fuscis irregulariter et in hemelytris dense collocatis irroratis, membrana venis albidis;