

3. Byrsoptera fuscicornis REUT.

Diagnosis: Nigro-picea, flavescenti-pubescens; rostro pedibusque cum coxis luteis, illius articulo primo piceo; capite utriusque sexus concolore; antennis fuscis, articulis ultimis tantum paullo pallidioribus (δ φ); hemelytris rufescenti-piceis, apice limbi externi corii basique cunei albidis, membranae venis fuscis. Long. δ 4, φ $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Turkestan (Soch!, Tschiburgan! Usunata!), D. FEDTSCHENKO.

Deser.: Corpus elongatum (δ) vel ovale (φ), nigro-piceum, nitidum, flavescenti-pubescens. Caput piceum. Oculi nigri. Rostrum luteum, articulo primo piceo. Antennae utriusque sexus fuscae, articulo primo fusco-nigro, secundo latitudine postica pronoti circiter $\frac{1}{3}$ (δ) vel haud (φ) longiore, duobus ultimis paullulum pallidioribus et simul sumtis secundo parum (δ) vel sat multo (φ) longioribus, gracilibus. Pronotum nigro-piceum, *maris* campanuliforme, basi sinuata longitudine circiter dimidio latius, lateribus levius sinuatum, disco apicem versus parum declive, *feminae* trapeziforme, basi apice duplo latius, margine basali leviter sinuato, disco transversim convexiusculum, apicem versus vix declive, lateribus rectis. Scutellum nigro-piceum. Hemelytra lateribus parallelis (δ) vel excurvatis (φ), rufescenti-picea, cuneo adhuc saturatiore, ipso apice limbi externi corii basique cunei albidis; membrana fumata, areolis limboque externo obscurioribus, fuscis, venis sordide testaceis vel fuscis, vitta vel macula ad apicem cunei albido-hyalina.

Gen. XXIV. HARPOCERA CURT.

Diagnosis: Corpus oblongum (δ) vel oblongo-ovatum (φ), nitidum; capite fere verticali, vertice utrinque foveolato, postice carinato; rostro apicem coxarum anteriorum vix superante; antennis remote setosis, ante apicem oculorum insertis, articulo secundo maris apice subtus compresso-dilatato; pronoti basi medio emarginato; xynho prosterni basi foveolato; tibiis nigro-punctatis et spinulosis, maris anticis posticisque curvatis; segmento maris genitali apice piloso.

Habitant hujus generis species in nemoribus Europae mediae et meridionalis.

Deser.: Genus brevitate rostri, structura capitis, antennis ante apicem oculorum insertis et ab eo remotis, setosis, earumque et tibiarum structura in mare etc. optime distinctum. Corpus oblongum (δ) vel oblongo-ovatum (φ), nitidum, in δ et φ dissimile. Caput sub-verticale, transversum, vertice postice marginato, utrinque ad oculum fovea magis minusve profunda instructo, fronte convexa, clypeo fortiter prominente, basi a fronte bene discreto, perpendiculari, a latere viso sat lato; genis minus humilibus, gula vix distinguenda, obliqua. Oculi granulati. Rostrum breve, coxas anticas haud vel vix superans, articulo primo caput vix vel haud superante. Antennae ante apicem oculorum insertae et ab eo sat remotae, longius remote setosae, articulo primo apicem clypei magis minusve longe superante, maris crasso, secundo apice in femina paullo crassiore, in mare autem subtus compresso-dilatato. Pronotum margine basali medio