

Obs. 2. Unicum masculum ex Hungaria (Tatra!) differt pubescentia fragili argentea, minus subtili, vertice oculo magno parum latiore, rostro multo graciliore et coxas posticas haud superante, cuneo minus elongato, basi concolore, segmentoque genitali subtus mutico, cetero autem praecedenti simillimum; forsitan speciem propriam constituit. Unicum tantum specimen antennis mutilatis examinavi.

Ante *Psallum luridum* REUT., p. 133, adde:

Psallus laticeps REUT.

Diagnosis: Supra dilute lurido- vel sordide flavo-testaceus, opaculus, capite, pronoto scutelloque fusciscentibus, parce fusco-pilosulus, pilis brevibus argenteis facillime divellendis pubescens; capite magno et lato; antennis pedibusque pallide flavo-testaceis, illis pilosulis, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus, articulo quarto tertio $\frac{3}{7}$ brevior (♀); femoribus minute fusco-punctatis, tibiis fusco-spinulosis, spinulis tiliarum anticarum subtilibus; cuneo basi intus paullulum pallidior, cetero autem concolore, membrana pallida, innotata, venis flavescens, crassiusculis; vertice feminae oculo magis quam duplo latiore. Long. ♀ $3\frac{2}{5}$ mm.

Var. β: Corio leviter rufescente.

Var. γ: Clavo apice cuneoque disco nonnihil fusciscentibus.

Hab. in *Abiete sibirica*: Siberia (Jenisei, Werchne Imbatsk!), D. Dr TRYBOM.

Descr.: Statura *Ps. Crotchii* SCOTT. simillimus. *Ps. pinicolae* REUT. affinis et similis, corpore autem magis robusto et paullo majore, supra pilis argenteis brevioribus instructo, capite adhuc majore et latiore, cuneo basi minus distincte pallido nec albedo membranaeque tota pallida venis crassioribus et distincte flavescens instructa bene distinctus. A *Ps. Piceae* REUT. corpore robustiore, minus oblongo, aliter pubescente, capite latiore etc. divergens. A *Ps. lapponico* REUT., cujus varietati pallidae sat similis, statura minore, antennis feminae aliter constructis etc. differt. A *Ps. lurido* REUT. magnitudine, antennis, capite pronotoque aliter constructis, tibiis subtilius et brevius spinulosis etc. mox distinctus. Corpus sat robustum (♀), supra dilute luridum vel sordide flavo-testaceum, antice fusciscentibus, parcius fusco-pilosulum, pilis brevioribus argenteis facillime divellendis ornatum, subtus colore in sordide virescentem vergente, densius sed breviter pallido-pubescentibus. Caput structura capiti *Ps. pinicolae* simillimum, magnum et latum, distincte transversum, pronoti latitudine basali tantum $\frac{2}{7}$ vel fere $\frac{1}{4}$ angustius, sordide lurido-testaceum vel fusciscentibus, clypeo lineis duabus longitudinalibus ferrugineis; vertice feminae (mas ignotus) oculo paullo magis quam duplo latiore. Rostrum flavo-testaceum, apice fuscum, medium ventris fere superans. Oculi fuscis. Antennae flavo-testaceae, articulis ultimis haud obscurioribus, articulo secundo latitudini pronoti basali aequae longo vel fere aequae longo, articulis duobus ultimis simul sumtis secundo longioribus, articulo quarto tertio circiter $\frac{3}{7}$ brevior. Pronotum sordide testaceum vel fusciscentibus-testaceum, callis bene discretis, fuscis vel luridis, apice quam basi circiter