

Hab. in Turkestan (Voruch!), D. FEDTSEHENKO.

Descr.: Corpus flavo-vires, albo-pubescent. Caput dilute virescenti-flavum vel pallidissime croceum, clypeo saepe saturatius virescente, vertice oculo fere $1\frac{2}{3}$ latiore (Ω). Oculi pallidi, albido-virescentes. Rostrum testaceum, basi virescens, apice fusco. Antennae virescenti-albae. Pronotum dilute virescenti-flavum vel pallidissime croceum, callis plerumque paullo saturatioribus. Scutellum virescenti-flavum vel pallide croceum. Hemelytra vitta limbi interni usque ad apicem membranae extensa et in ejus parte media currente fusca, hac vitta in clavo et corio minute obscurius fusco-punctata et fusco-pilosula; vitta alia in dimidio exteriore clavi et in medio corii currente usque in apicem cunei prolongata et cuneum totum colorante croceo-flava; limbo corii externo late albo; membrana alba, venis dilute croceis, vena brachiali in vitta fusca fuscescente. Pedes dilute flavescentes, tibiis tarsisqve albidis, illis albido-spinulosis, his apice articuli ultimi fusco.

Gen. XII. MALTHACOSOMA REUT.

Tab. I, fig. 11.

Diagnosis: Corpus oblongo-ovatum, pilis nigris destitutum, albo-pubescent; capite fortiter nutante, apicem versus longius rostrato-producto, latitudini posticae cum oculis longitudine aequali, a latere viso autem altitudine longiore, clypeo basi a fronte bene discreto et prominente, leviter arcuato et a latere viso ubique fere aequo lato, ipsa basi fere in linea media oculari posita, gula in plano peristomii posita; oculis in genas longe extensis, magnis; rostro coxas posticas paullulum superante, articulo primo dimidium xyphi haud attingente; pronoto margine apicali recto vel sub-recto; hamo areolae venae decurrente ex eodem puncto excurrentibus; xypho concavo, lateribus acute et sat alte marginatis; tibiis fusco-spinulosis, tarsis posticis articulo tertio duobus primis simul sumtis distinete breviore, sed articulo secundo longitudine aequali, ungviculis sat magnis.

Habitat species unica hactenus cognita in desertis partis austro-orientalis territorii.

Descr.: A genere *Leucoptero* REUT., cui maxime affine videtur, capite haud transverso, longius rostrato-producto, clypeo multo latiore et aliter constructo, rostro longiore, xypho lateribus acute marginato, articulo tarsorum ultimo breviore distinguendum. A *Solenoxyphe* REUT. capite minus lato, xypho marginato etc. divergens. Corpus oblongo-ovatum (σ), pilis nigris omnino destitutum, albo-pubescent, opacum. Caput fortiter nutans, pronoti basi circiter $\frac{2}{5}$ angustius, antice visum acute et longe quinqvangularis, latitudini posticae longitudine aequale (σ), a latere visum altitudinem latitudine clypei superans, clypeo a fronte bene discreto et prominente, lato et crasso, leviter arcuato et a latere viso (basi excepta) ubique fere aequo lato, ipsa basi fere in linea intermedia oculorum posita, angulo faciali acuto, gula dimidio capitidis breviore, in plano peristomii posita. Oculi magni, in genas longe extensi (σ), orbita interiore