

strum apicem mesosterni attingens, articulo primo apicem capitis vix superante, virescens, apice fusco. Antennae virescenti-testaceae, subtiliter fusco-pubescentes, articulo secundo linearis, latitudine pronoti postica circiter $\frac{1}{4}$ breviore, sat robusto. Pronotum basi longitudine haud duplo latius, lateribus sub-sinuatis, apice fortius sinuato subtilissimeque marginato longitudine circiter $\frac{1}{5}$ angustius, disco apicem versus declive, totum glauco-virescens. Scutellum glauco-virescens, basi (an semper?) luteum. Hemelytra pallide flaventia colore leviter in virescentem vergente, pilis nigris fragilibus longis pubescentia, cuneo venisque membranae albidae dilutissime sulphureis, membrana medio arcu fuscescente arcui venarum concentrico ab apice cunei versus basin marginis interioris ducto ornata, infra venam brachialem versus ejus apicem linea sulphurea. Pectus et abdomen virescenti-flava, longius pallido-pubescentia, mesosternum medio fuscum. Pedes subtilius nigro-pubescentes, femoribus fere luteis, his posticis ante apicem atomis nonnullis fuscis conspurcatis, tibiis virescentibus, brevius nigro-spinulosis, tarsis fuscotestaceis, articulo ultimo apice nigro-fusco.

10. *Oncotylus caspicus* REUT.

Diagnosis: Pallido-flavescens, sub-nitidus, supra remotius nigro-pilosus, antennis pedibusque dilute fuscescenti-pubescentibus, tibiis impunctatis parcus et subtiliter sat longe nigro-spinulosis, tarsis articulo ultimo nigro; hemelytris semi-pellucentibus, pilis e punctis dilutissime fuscescientibus nascentibus, clavo apice maculaque corii apicali magna venam cubitalem pallidam includente dilute fuscescientibus; membrana areola majore limbo marginali minoreque tota, vitta obliqua infra apicem areolarum striaque lata transversali infra maculam hyalinam ad apicem cunei positam fuscescientibus; capite transverso, vertice oculo tantum paullo latiore (δ); articulo secundo antennarum linearis latitudine postica pronoti longiore. Long. δ 4 mm.

Hab. in Rossia meridionali (Astrachan!), communicavit D. JAKOVLEFF.

Descr.: Corpus oblongum (δ), pallido-flavescens, sub-nitidum, supra sat remote nigro-pilosum. Caput pallide flavo-testaceum (δ), basi pronoti circiter $\frac{4}{7}$ angustius, fortiter nutans, antice visum latitudine paulo brevius, a latere visum altitudini longitudine aequale, parte ante-oculari oculo paulo latiore, vertice oculo tantum paullulum latiore, fronte declivi, clypeo perpendiculari, gula circiter $\frac{2}{5}$ capitidis longitudinis superante, fere in plano peristomii posita. Oculi maris magni, convexi et prominentes, in genas longe extensi, orbita interiore fortius sinuati. Rostrum fere apicem coxarum intermediarum attingens, testaceum, apice nigro, articulo primo virescente, caput parum superante. Antennae pallide flavo-testaceae, dilute fuscescenti-pubescentes, articulo secundo linearis et latitudine postica pronoti longiore. Pronotum basi longitudine duplo latius, lateribus sub-sinuatis, apice sinuato longitudini latitudine aequale, disco parum declivi; pallide flavescens vel lateribus nonnihil virescens. Scutellum pallido-flavescens. Hemelytra albicanti-testacea, semi-pellucentia, nitidula, e punctis vix distinguendis di-