

Gen. XXI. **ONYCHUMENUS** REUT.*Oncotylus* p. FIEB.

Tab. I, fig. 21.

Diagnosis: Corpus elongatum (♂) vel sub-ovale (♀), subtiliter pubescens; capite leviter nutante, praesertim maris transverso, fronte leviter declivi, clypeo prominente in capite verticaliter posito, ejus basi fere in linea intermedia partis superioris oculorum posita, angulo faciali recto; rostro apicem coxarum intermediarum attingente, articulo primo fere medium xyphi attingente; antennis articulo secundo latitudine capitis postica longiore, articulis ultimis conjunctis brevioribus; pronoti apice profundius sinuato; xypho prosterni marginato; tarsis posticis breviusculis, articulis duobus ultimis aequae longis, ungviculis sat parvis, leviter curvatis, aroliis maximis, laminato-explanatis, cum ungviculis conjunctis et eorum apicem superantibus.

Habitat hujus generis unica species locis aridis inter plantas synanthericas.

Descr.: Ab *Oncotylus* FIEB., REUT. structura capitis, praesertim basi clypei multo altius posita fronteque minus convexa et minus declivi, genis minus altis, corpore subtiliter pubescente, minus robusto, tarsis posticis brevioribus, ungviculis minoribus aroliisque maximis laminato-explanatis bene distinctus videtur. Corpus elongatum (♂) vel sub-ovale (♀), subtiliter pubescens. Caput pronoti basi circiter $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{5}$ (♂) angustius, leviter nutans, antice visum quinquangulare, transversum, a latere visum altitudinem clypei latitudine superans, fronte parum declivi, leviter convexa, clypeo sub angulo acuto prominente, verticaliter in capite posito, ipsa basi cum fronte sub-confluente et longius supra lineam intermediam oculorum posita, genis parum altis, angulo faciali recto, gula leviter obliqua, dimidia capitis longitudine paullo brevioribus. Oculi in capitis lateribus leviter oblique positi, oblongi, etiam in femina in genas sat extensi. Rostrum apicem coxarum intermediarum attingens, articulo primo medium xyphi prosterni attingente. Antennae mox supra oculorum apicem vel in linea intermedia partis inferioris oculi interne insertae, articulo secundo capitis latitudine longiore, duobus ultimis conjunctis secundo longioribus, tertio vix huic aequae longo (♂) vel hoc tantum paullo brevioribus (♀). Pronotum breviter trapeziforme, apice profundius sinuato, lateribus sub-sinuatis, callis disci discretis, disco leviter declivi. Scutellum basi detectum. Hemelytra completa, membrana bi-areolata. Alarum areola hamo a vena subtensa emisso, a basi venae decurrentis parum remoto. Xyphus prosterni distincte marginatus. Mesosternum convexum. Coxae anticae breves, mesosterni medium vix attingentes. Tibiae subtiliter nigro-spinulosae. Tarsi postici sat breves, articulis duobus ultimis longitudine aequalibus, ungviculis minutis leviter curvatis, dente basali sat obtuso, aroliis maximis ungviculis longioribus. Terebra feminae medium ventris attingens.