

dilute ochraceis; femoribus apice minute fusco-conspersis, tibiis spinulis longis albis dense positis e punctis parvis fuscis nascentibus. Long. ♂ $3\frac{2}{5}$, ♀ $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{2}{3}$ mm.

Hab. in Turkestan (Tjardara!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: Corpus supra album, albo- vel fere argenteo-pubescent. Caput latitudine pronoti basali fere $\frac{2}{5}$, — paullulum minus quam duplo angustius, album, lateribus saepe paullo virescens, vertice medio atomis tribus, duobus nempe marginalibus, uno disco- dali (♂), vel puncto majore in medio marginis (♀) punctisque quatuor in arcum postice in femina quam in mare latius concavum positis, lineis frontis transversalibus puncto que basali clypei dilute ochraceis; clypeo fortiter perpendiculariter arcuato- deflexo, angulo faciali recto; vertice oculo latitudine aequali (♂) vel hoc circiter $\frac{2}{3}$ latiore (♀). Rostrum album, apice fusco. Antennae albae, hic illic leviter virescentes, articulo secundo maris sat incrassato, duobus ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus (♂♀). Pronotum basi longitudine duplo latius, apice longitudine haud (♂) vel distincte (♀) latius, disco apicem versus parum declive; album, punctis fuscis sat ae- qualiter conspureatum, callis autem apiceque innotatis, illis angulo interno saepe puncto dilute ochraceo; lateribus nonnihil virescentibus. Scutellum album, fusco-conspersum, basi saepe dilute ochracea. Hemelytra alba, ubique punctis fuscis sat dense et aequa- liter conspersa, his punctis hic illic in annulos positis, membrana subhyalina, venis al- bis. Alae vena decurrente hamoque areolae ex eodem puncto excurrentibus. Pectus et abdomen albida, dorso abdominis virescente. Pedes albi, femoribus apice punctis minutis fuscis conspersis, tibiis dense et longe albo-spinulosis, spinulis e punctis par- vis fuscis nascentibus, tarsis ungviculis fuscescentibus.

4. Atomophora fusco-maculata REUT.

Diagnosis: Pallide flavens, hic illic rubro-adspersa, oculis, maculis duabus majoribus pronoti, duabus ante apicem scutelli, commissura clavi, macula ante medium corii aliaque apicali vena cubitali interrupta fuscis, corio clavoque punctis fuscis pilas fuscescentes emittentibus conspersis; membrana fumata gut- tulis hyalino-albidis adspersa, limbo externo maculis duabus hyalino-albidis, venis ad maximam partem albidis; antennis pedibusque pallidis, innotatis, tan- tum apice femorum posticorum rubro; oculis orbita interiore tantum in triente basali parallelis. Long. ♂ $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in terris circa mare Caspicum!, D. JAKOVLEFF.

Descr.: A speciebus reliquis pedibus punctis fuscis destitutis, oculis maris tantum in triente basali parallelis, pronoti apice medio distinctius sinuato etc. divergens. Cor- pus pallide flavens, sub-glabrum. Caput antice visum latitudine circiter $\frac{1}{4}$ brevius, a latere visum altitudine paullo brevius, pallide flavens, frontis colore in rubrum praeser- tim versus latera vergente. Oculi fuscii, maris maximi, in gulam prolongati, orbita in- teriore in triente basali sub-parallelis, dein profunde sinuati, apice appropinquati. Ro-