

Agalliastes Wilkinsoni Dougl. et Sc., pag. 66, *adde*: *Hab.* in territoriis frigidis Siberiae occidentalis (Dudinka!, Tolstoinos!), Norvegia (Salten!, Bodö!), D. J. SAHLBERG.

Agalliastes evanescens BOH., pag. 67, *adde*: *Hab.* in *Anchusa*, sec. D. Prof. FREY-GESSNER.

Atomoscelis REUT., pag. 67, lin. 13, *infra*, *legitur*: antennis articulo secundo latitudine capitis longiore; *deletur*. Lin. 1, *infra*, *legitur*: secundo latitudine capitis longiore; *deletur*. Haec verba tantum ad *A. onustum* referenda; novam speciem autem hujus generis D. JAKOVLEFF detexit, cuius articulus secundus antennarum capitis latitudini aequa longus:

Atomoscelis brevicornis REUT.

Diagnosis: Prasinus, unicolor, tantum capite nonnihil flavescente; antennis virescentibus, unicoloribus, articulo secundo capitis latitudini posticæ longitudine aequali; membrana tota hyalina, venis virescentibus; femoribus supra fere innotatis, subtus apicem versus atomis nonnullis adspersis; spinulis tibiarum nigris, e punctis nigris nascentibus; tarsis posticis articulo ultimo duobus primis simul sumtis paullo breviore. Long. ♀ $2\frac{1}{4}$ mm.

Syn.: *Atomoscelis brevicornis* REUT., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXI, 39, 15!

Hab. in Rossia meridionali (Astrachan!), D. JAKOVLEFF.

Descr.: Structura capitis et poronoti, longitudine rostri etc. *A. onusto* FIEB. omnino similis, differt brevitate antennarum et praecipue earum articuli secundi, corpore unicolo, punctis femorum minutis, superne omnino obsoletis tibiisque nigro-spinulosis. Corpus virescens vel prasinum, omnino unicolor, subtus albicanti-pubescentes (pilae superficie superioris in specimina detritae?). Caput latitudine basali pronoti circiter $\frac{1}{3}$ angustius, nonnihil flavescentes. Oculi nigri. Rostrum coxas posticas attingens, virescens, apice latius fusco-nigro. Antennae corpore cum hemelytris circiter duplo breviores, unicoloriter virescentes, subtilissime albicanti-pubescentes, articulo secundo latitudini basali capitis longitudine aequali, duobus ultimis simul sumtis hoc paullulum longioribus. Pronotum basi longitudine magis quam duplo latius, callis leviter flavescentibus. Scutellum apice paulo obscurius virescente. Hemelytra omnino unicoloriter dilute prasina; membrana cum areolis tota hyalina, venis virescentibus. Pectus et abdomen virescentia. Pedes femoribus virescentibus, margine antico ante apicem seta nigra, supra innotatis, subtus apicem versus atomis nonnullis fuscis adspersis, posticis etiam superne punctis minutis fuscis in seriem obliquam prope apicem positis; tibiis albidis, spinulis nigris e punctis sat magnis nigris nascentibus; tarsis subtestaceis, articulo ultimo duobus primis conjunctis breviore, apice fusco; unguiculis dente basali ut in *A. onusto* armatis.

Ante *Plagiognathum spilotum* FIEB., pag. 71, *adde*:

Plagiognathus? annulicornis REUT.

Diagnosis: Virescens, capite et pronoto pilis argenteis parce adspersis, hemelytris pilis nigris fragilibus pubescentibus; capite, pronoto antice basique