

- debilis* Reut., *nebulosus* Fieb., *tristis* Fieb.), *Plagiotylus* Scott (*Bolivari* Reut.. *maculatus* Scott).
51. *Pachytomella Passerinii* Costa, *Ann. Soc. Ent. Fr.*, 1841,
p. 288 (*Phytocoris*) = ♂.
Pachytoma minor ibid., p. 289 = ♂.
Orthocephalus minor Fieb., 1861.
52. *Orthocephalus Proserpinæ* M. et R., 1852 (*Capsus*).
Orthocephalus coracinus Fieb. et Put., 1874.
53. *Orthocephalus mutabilis* Fall.
Capsus stygialis M. et R. = ♀.
54. *Anapus longicornis* Jak., 1882.
Labops arenarius Horv. 1884.
55. *Dimorphocoris gracilis* Ramb., 1842. = ♂.
Orthocephalus signatus Fieb., 1861. = ♀.
56. *Megalocoleus* m.
Macrocoleus Fieb., 1860, nom. præocc. (Des. 1849, Hymenoptera).
57. *Psallus ancorifer* var. *fuscinervis* Reut.
Psallus puberulus Mont. 1887, sec. spec. typ.
58. *Psallus limbatellus* Put. 1890 (*Maurodactylus*). Femora tibiis obsecuriora, rufa, postica inferne punctis nigris (parcius) adpersis. Structura capitis cum gen. *Psallus* congruit, oculi tamen læves. Pili fragiles in speciminiibus verisimiliter detriti.
59. *Asciodesma Fieberi* D. et S., species in *Cat. Put.* omissa.
60. *Plagiognathus albipennis* Fall.
Phytocoris betuleti Hahn, 1834, nec Fall.
Obs. Magnitudo, color pedum anteriorum! « Ich fand sie immer nur im Grase » (Hahn). Specimina (♂) cum figura Hahni in omnibus convenientia in Fennia meridionali inveni.
61. *Ethelastia* Reut. = Genus divisionis *Plagiognatharia*!
Pronotum strictura annuliformi apicali destitutum; alarum areola hamo distincto; arolia cum unguiculis longissimis tota connexa. Forsitan in vicinitate generis *Phylus* Hahn optime locanda.