

## CAPSIDÆ NOVÆ EX AFRICA BOREALI.

Descriptis O.-M. REUTER.

### 1. *Lygus fuscus* n. sp.

Fuscus, superne leviter nitidus, superne capite scutelloque exceptis sat fortiter et remote punctatus, inferne fortius nitidus, margine postico pronoti, clavo medio, apice scutelli, rostro, antennis, pedibus orificiisque metastethii pallide lurido-flaventibus, antennarum articulo secundo versus apicem, rostro dimidio apicali, femoribus annulis duobus ante apicem, tibiis annulis tribus tarsisque fuscescentibus; capite fusco striato et lineolato, vertice ( $\sigma$ ) oculo magno nigro-piceo fere duplo augustiore, postice tenuissime marginato; rostro coxas posticas paullo superante; tibiis punctis destitutis, anticis submuticis, posterioribus fuscescenti-spinulosis. —Long.,  $\sigma$ , 5 mill.

Ægyptus, Siout; unicum specimen misit D. Prof. Costa (Mus. Neapolitanum).

Caput basi pronoti fere triplo angustius, pallide lurido-flavens, sat nitidum, læve, fronte utrinque striis sex transversalibus, clypeo vittula basali, lineolis duabus mediis vittaque apicali. genis maculis nonnullis fuscis. Oculi nigro-picei altitudinem totam capitibus occupantes. Antennæ articulo secundo latitudine basali pronoti circiter  $2/5$  brevioris, duobus ultimis fere æque longis, simul secundo paullo brevioribus. Pronotum trapeziforme, leviter convexum, basi longitudine vix duplo latius, callis exceptis sat remote sed versus latera densius impresso-punctatum, disco postice pallidius. Scutellum læve. Hemelytra sat remote impresso-punctata, punctis versus apicem corii cuneique minoribus, levius impressis; membrana fumata, basin versus cum areolis hyalinescente, venis luridis, brachiali versus apicem fuscescente. Pectus glabrum, epimeris prostethii fortiter punctatis. Venter nitidus, flavo-pubescentis.

### 2. *Camptobrochis pallidus* n. sp.

Oblongo-ovalis, pallide flavens, pronoto hemielytrisque dense concoloriter punctatis, corio apicem versus cuneoque sublævibus,

superne glaber, antennis pedibusque pilosulis, illis articulo secundo apice duobusque ultimis fuscis, tertio basi pallido, his femoribus anterioribus marginibus apicem versus, posticis annulis duobus antepicalibus magis minusve completis, tibiis margine superiore ultra medium apiceque fuscescenti-sanguineis, tarsis apice fuscis; capite et pronoto fusco-signatis; scutello fusco, lateribus pallidis; hemielytris macula subbasali cuneiformi inter venas, apice clavi vittam pallidam includente fascia obliqua apicali corii bis pallido-interrupta, angulis anteriore et apicali cunei venisque membranæ fuscis, hac basi cum areolis hyalina, dimidio apicali fumata. — Long., ♂, 4 1/2 mill.

Ægyptus, Jajoum; unicum marem communicavit D. Prof. Costa (Mus. Neapol.).

*C. pilipedi* Reut. statura signaturisque sat similis, corpore superne multo densius concoloriter punctato, vertice maris latiore, oculis ejus minus fortiter granulatis, pronoti lateribus, antennis tibiisque pilis longis exsertis destitutis signaturaque pedum bene distinctus. Caput læve, stramineum, macula verticis inæquali picea, striis frontis, lineis duabus clypei maculisque genarum ochraceis; vertice (♂) oculo latiore. Oculi magni, nigro-fusci. Rostrum coxas intermedias attingens, apice nigro-fusco. Antennæ (♂) articulo secundo lineari, latitudine basali pronoti paullo brevior, duobus ultimis simul 2<sup>o</sup> circiter 1/3 brevioribus. Pronotum dense concoloriter punctatum, callis parvulis, annulo collari stramineo, disco postico fuscescenti-maculato. Prostethium epimeris fuscescentibus punctatis, xypho lævi, marginato, stramineo. Mesosternum fuscum. Metastethium fuscum, area orificiorum straminea. Venter pallide flavens, molliter cano-pubescent, lateribus infuscatis. Femora inferne pilis nonnullis longis exsertis instructa. Tibiæ muticæ.

### 3. *Systellonotus Putoni* n. sp.

Mas elongatus, cum antennis et pedibus fusco-niger, unicolor; hemielytris nigro-fuscis, ima basi corii et clavi cuneoque nitidulis; corio fasciis duabus niveis, altera mox ante medium, altera apicali, illa latiore, interne et antice cum guttula parva clavi ad medium suturæ posita confluyente, capite pone oculos brevissimo; oculis exsertis; antennis articulo secundo versus apicem levissime incrassato, tertio secundo fere 1/5 brevior; pronoti basi annulo apicali duplo et dimidio latiore. — Long., 4 mill.

Tunisia, Mekalta; unicum marem misit D. Dr. Puton (Collectio Puton).

*S. thymi* Sign. simillimus et valde affinis, nisi solum ejus varietas, antennarum articulo secundo fere graciliore et paullo longiore fasciaque anteriore corii in clavum breviter prolongata distinctus videtur. Caput basi pronoti circiter  $\frac{1}{4}$  angustius, latitudine cum oculis parum longius, vertice oculo circiter  $\frac{2}{5}$  latiore. Antennæ fere ad tertiam partem apicalem oculorum interne insertæ, articulo primo oculo longitudine æquali. Pronotum annulo apicali basi circiter  $\frac{3}{5}$  angustiore, disco versus apicem valde declivi. Scutellum parte apicali convexiuscula. Hemielytra nigro-fusca, opaca, basi corii et clavi, margine laterali, margine corii commissurali anguloque ejus externo nec non cuneo nitidis; corio fasciis duabus albis, altera latiore ante medium, altera apicali augulum corii interiore non attingente, illa margine superiore leviter obliqua, interne dimidio superiore in clavum breviter prolongata; membrana fusca. Tarsi postici articulo secundo tertio multo longiore.

#### 4. *Læmocoris Costæ* n. sp.

Fuscus, superne parcius breviter flavicanti-setulosus, antennis luteo-testaceis, articulo primo albido, dimidio basali margineque apicali sanguineo-fuscis; rostro, articulo primo excepto, apice coarctatum, tibiis tarsisque lutescenti-albidis; hemielytris clavo concolore, corio maculis duabus albis, altera basali triangulari postice medium attingente, altera apicali quadrangulari; disco pronoti et parte apicali scutelli sat leviter convexis.—Lon., ♂,  $3\frac{3}{4}$  mill.

Ægyptus, Minieh; unicum marem communicavit D. Prof. Costa (Mus. Neapolit.).

Corpus superne parum nitidum. Caput subverticale, basi pronoti duplo angustius, ab antico visum latitudini cum oculis æque longum, vertice linea longitudinali impressa instructo, oculo circiter  $\frac{2}{3}$  longiore, a latere visum altitudini longitudine æquale, fronte sat fortiter convexo-declivi, clypeo fortiter prominente, perpendiculari, angulo fasciali recto, gula brevi, sat bene distincta, obliqua. Rostrum articulo primo basin xyphi prostethii paullo superante. Antennæ articulo primo apicem clypei superante, articulis reliquis linearibus, secundo primo circiter quadruplo longiore, 3<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> fere  $\frac{1}{4}$  breviora. Pronotum latitudine basali vix magis quam  $\frac{1}{6}$  brevius, lateribus sinuatis, basi quam apice paullo magis quam duplo latius, margine basali latissime sinuato, annulo apicali lateribus optime medio autem obsolete discreto, disco versus apicem minus fortiter convexo declivi. Scutellum parte basali fortiter declivi, apicali leviter convexa. Hemielytra setulis nitidulis semi adpressis

flavis subseriatis instructa. Hemelytra macula basali totam latitudinem, apicali parum magis quam dimidium latitudinis corii occupante; membrana fusca, ad apicem cunei macula hyalina. Venter pallido-pubescens.

#### 5. *Cyrtorrhinus parviceps* n. sp.

Niger vel piceo-niger, nitidus, antennis articulo primo ima basi et apice, macula verticis utrinque, pronoto antice, marginibus peccoris, ventre medio late pedibusque pallide ochraceis, tibiis basi fusca vel nigro-picea; hemelytris sordide flavo albidis, membrana hyalina, venis pallidis; capite basi pronoti  $1/4$  ( $\sigma$ ) vel fere  $1/3$  ( $\varphi$ ) angustiore, oculis parum prominutis.—Long., 2  $1/2$  mill.

Egyptus, Cairo m. majo legit D. Dr Schweinfurth; in paludibus prope Aboukir D. Innès; communicavit D. Autran (Coll. Autran, Montandon, Reuter).

*C. pygmaeo* Zett. simillimus, capite multo angustiore tibiarumque basi nigro-picea vel saltem fuscescente mox distinguendus. Capite angusto ab omnibus *Cyrtorrhini* speciebus divergens, cum eis tamen notis reliquis congruens. Corpus oblongum ( $\sigma$ ) vel oblongo-ovatum ( $\varphi$ ), omnium subtilissime pallido-pubescens. Vertex oculo  $2\frac{2}{5}$  ( $\sigma$ ) vel  $2\frac{1}{2}$  ( $\varphi$ ) latior. Oculi fusci, laeves. Antennae articulo primo ima basi apiceque albidis, secundo latitudini basali pronoti longitudine aequali ( $\varphi$ ) vel hac parum longiore ( $\sigma$ ), ultimis simul 2° paullo longioribus. Pronotum basi longitudine duplo latius, lateribus leviter sinuatis, fascia apicali ochracea interdum medio interrupta, ipso margine apicali fuscescente. Tibiae nigro-spinulosae.

#### 6. *Campylognathus* n. g.

Corpus oblongum, capite verticali, distincte transverso, a latere viso altitudini fere aequae longo, clypeo compresso, angusto, sat prominente, medio fortius arcuato, basi fere in linea intermedia oculorum posito, oculis pronoto contiguis, in genas longius extensis, minute granulatis, gula horizontali ab apice oculorum subito antrorsum declivi; rostro coxas intermedias attingente, articulo primo caput haud superante; pronoto callis discretis, transversis; antennis ( $\sigma$ ) brevibus, paullulum supra apicem oculorum interne insertis, articulo secundo capite vix latiore; femoribus totis concoloribus, innotatis; tibiis nigrospinulosis; tarsis posticis articulis duobus ultimis longitudine aequalibus, unguiculis versus

apicem sensim leviter arcuatis, aroliis cum eis totis connexis eorumque medium attingentibus.

Generibus *Asciodema* Reut. et *Damioscea* Reut. affinis, structura capitis, rostri, antennarum et tarsorum mox distinctus. A *Maurodactylo* Reut., cui etiam affinis, clypeo fortius arcuato, magis prominente, basi a fronte distinctius discreto, gula longiore incurvata, tarsis posticis brevioribus divergens. Corpus pallido-pubescescens. Caput superne visum breviter pentagonale, ab antico visum fere triangulare, verticis margine æquali, fronte fortiter declivi, angulo faciali recto, genis humilibus. Oculi orbita interiore late sinuati. Rostrum gracile, articulo 1<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> parum longiore, duobus ultimis longitudine subæqualibus, simul 2<sup>o</sup> paullo longioribus. Antennæ articulo primo apicem clypei paullo superante. Pronotum trapeziforme, fortiter transversum, basi truncatum, lateribus reclis, disco versus apicem leviter declivi, callis medio distantibus. Scutellum basi detecta. Hemelytra completa, membrana biareolata. Alæ areola hamo a vena subtensa emisso, ab origine venæ decurrentis paullo remoto. Xyphus prosterni disco subplano, marginibus lateralibus declivibus. Mesosternum versus apicem leviter convexum, margine apicali utrinque sulco brevi orificiali transversali tenuiter marginato instructum. Metastethium orificiis distinctis, transversim subovalibus, margine externo tumido. Coxæ anticæ medium mesosterni attingentes, posteriores contiguæ, posticæ ab epipleuris hemelytrorum sat remotæ. Terebra feminae medium ventris haud superans.

### **C. nigrigenis n. sp.**

Pallide flavo-testaceus vel subochraceus, minus dense longius flavicanti-pubescescens, oculis ferrugineis; fronte utrinque striis transversalibus quinque, callis pronoti, articulis duobus ultimis antennarum, mesosterno apiceque articuli ultimi tarsorum fuscis; clypeo, genis, gula, antennarum articulo primo basique secundi nec non prosterno nigris, clypeo medio (an semper?) lineola longitudinali testacea.—Long., ♀, 2 2/5 mill.

Algeria, Biskra; unicam feminam misit D. Dr Puton (Coll. Puton).

Caput basi pronoti fere 1/3 angustius, a supero visum pronoto brevi distincte longius, ab antico visum latitudine interoculari oculique unici vix longius. Rostrum articulo ultimo apice nigro. Antennæ articulo 3<sup>o</sup>, 2<sup>o</sup> fere 1/4 brevior. Pronotum apice longitudine fere duplo latius et basi circiter 2/5 angustius. Scutellum ochra-

ceum, apicem versus pallidius flavescens. Hemelytra clavo pallidius flavente, corio cuneoque subtestaceis, margine laterali pallidiore; membrana pallida, iridescente, venis pallidis. Abdomen ochraceum, dorso nigro.



*Campylognathus rufigenis* Reut. ♀.

---

## NOTES SUR QUELQUES HÉMIPTÈRES DE MADÈRE

Par O.-M. REUTER.

---

Dans la *Revue d'Entomologie*, 1889, VIII, p. 297, M. le Dr Puton a publié une liste des espèces récoltées à Madère. Dans ma collection se trouvent encore les espèces suivantes, capturées dans cette île, mais non encore citées de cette localité.

*Sciocoris Helferi* Fieb. Specimen unicum in omnibus cæteris typo simillimum, 6 1/2 mill. longum, solum capitis lateribus ante oculos vix nisi omnium obsoletissime sinuatis ejusque apice vix inciso divergit. In museo Havniæ etiam specimina *Sciocoris Helferi* in Madeira lecta vidi.

*Ischnorrhynchus geminatus* var. *grisescens* Put.

*Scelopostethus adjunctus* D. et Sc.

*Esuridea maculata* n. g. et sp.

*Monanthia (Platychila) cardui* L., nov. var. *maderensis*.

*Pirates chiragra* Fabr.

### DESCRIPTIONS DES FORMES NOUVELLES.

**Esuridea** nov. gen.

(Divisionis *Beosaria*).

Corpore breviter obovato; capite longitudine latitudini subæquali; tuberculis antenniferis antrorsum declivibus: ocellis parvis; antennis subnudis; pronoto lateribus anguste lineariter de-