

sterni (σ) vel coxarum intermediarum (Ω) attingens. Antennae mox infra apicem oculorum interne insertae, articulo primo apicem clypei attingente (σ) vel subattingente (Ω), secundo latitudini basali pronoti fere aequelongo (σ) vel hac paullo longiore (Ω brach.), versus apicem praecipue in femina distinete incrassato, duobus ultimis simul secundo longioribus. Pronotum sub-laeve, callis bene discretis, maris basi longitudine vix magis quam dimidio latius, versus apicem leviter declive, lateribus rectis, apice quam basi circiter $\frac{2}{5}$ angustiore, feminae brachypterae horizontale, versus apicem levissime angustum; margine basali medio late sinuato. Hemelytra maris subparallela, nigra, vitta lata corii juxta suturam clavi sordide albido-flavente in angulum interiore apicalem corii continuata, membrana nigricante, dimidio basali plerumque sordide albido-flavente, venis maculisque nonnullis nigro-fuscis; feminae segmentum sextum dorsale sub-attingentia, apice versus suturam oblique late rotundata, sutura clavi sub-distinguenda, incisura laterali cunei distincta. Pedes toti nigri.

4. Orthocephalus niger REUT.

Diagn.: Totus niger, pedibus obscure fuscis vel nigricantibus, supra nigro-setosus, pilis argenteis divellendis tectus; vertice marginato oculo duplo latiore (σ); antennis articulo secundo gracili apicem versus vix incrassato primo circiter triplo longiore, tertio primo solum circiter $\frac{1}{5}$ breviore; pronoto scutelloque sublaevibus; ipsa sutura clavi angustissime pallida. Long. σ $5\frac{1}{2}$ mm.

Syn.: *Orthocephalus niger* REUT., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXI, 203, 9! Fedtsch. Hem. Turk. 17, 1!

Hab. in Turkestan (Varzaminor!), D. FEDTSCHENKO.

Descr.: Ab *O. mutabili* FALL., cui colore antennarum pedumque similis, illarum articulo secundo gracilior, coloreque hemelytrorum distinctus; ab *O. saltatore* HAHN corpore longius et densius nigro-setoso, pedibus obscurioribus, praecipue autem vertice latiore distingvendus. Corpus nigrum, modice nitidulum, supra longe nigro-setosum, pilis squamiformibus argenteis vel albis divellendis dense vestitum. Caput cum oculis basi pronoti tantum fere $\frac{1}{4}$ angustius, latitudini cum oculis aeqvelongum, vertice basi arcuato-marginato, usque a basi cum fronte et clypeo in arcum communem confluente, clypeo basi parum discreto, basi in linea inter bases antennarum ducta; gula sat longa; vertice maris acuto oculo duplo latiore. Rostrum coxas intermedias attingens, piceonigrum. Antennae corpore cum hemelytris circiter $\frac{1}{3}$ breviores, nigrae, longe nigro-pilosae, mox infra apicem oculorum insertae, articulo primo latitudine verticis circiter $\frac{1}{4}$ breviore, secundo primo circiter triplo longiore, latitudini basali pronoti longitudine aequivali, linearis, gracili, duobus ultimis simul sumtis secundo longioribus, tertio secundo solum circiter $\frac{1}{5}$ breviore (σ). Pronotum apice longitudini latitudine sub-aeqvale, basi longitudine minus quam duplo latius, lateribus rectis sat angustatis, longe nigro-setosum, callis discretis, disco postico sub-laevi. Hemelytra nigra, tantum ipsa sutura clavi angustissime pallido-pellucente, membrana tota nigricante, venis nigris, areola majore, di-