

oculorum interne insertae, articulo primo apicem clypei attingente (σ) vel breviore (φ), secundo latitudini basali pronoti aequelongo, ultimis simul secundo solum paullo longioribus, tertio secundo vix $1\frac{1}{4}$ (σ) vel paullo minus quam $1\frac{1}{4}$ (φ) breviore, quarto tertio circiter duplo breviore; nigrae, articulo primo toto secundoque vix quarta basali parte (σ) vel dimidio basali (φ) luteo-testaceis. Pronotum basi longitudine $\frac{3}{4}$ (σ) vel fere duplo (φ brach.) latius, versus apicem fortius (σ) vel leviter angustatum, apice quam basi tamen fere $\frac{1}{5}$ angustius (φ brach.), disco sub-laeve, versus apicem leviter declive (σ , φ macr.) vel horizontale (φ brach.), callis minus discretis. Hemielytra nigra tota; maris semper completa, abdomen quam in affinibus minus longe superantia, parallela, membrana obscure fumata, ad apicem cunei macula hyalinescente; feminae macropterae abdomen dimidia membrana superantia, lateribus latissime rotundata, vel abbreviata, segmentum sextum dorsale subattingentia, apice versus suturam oblique late rotundata, sutura clavi sub-distincta, incisura laterali cunei discreta. Pedes nigri vel fusco-nigri, apice femorum anteriorum tibiisque fulvo-testaceis, his nigro-spinulosis, apice sat anguste nigris, spinulis e punctis parvis vel vix distingvendis fuscis nascentibus.

8. Orthocephalus parvulus REUT.

Tab. I, f. 10 c (caput et pronotum feminae brach.).

Diagn.: Niger, nigro-setosus, pilis squamiformibus albis faciliter divellendis vestitus, antennis articulo secundo feminae versus basin plerumque tibiisque ferrugineis, his nigro-spinulosis, sed punctis nigris destitutis, apice anguste nigris; hemielytris totis fusco-nigris, membrana angulo inter apicem cunei et areolem minorem albido; vertice obsolete marginato, oculo a tergo viso circiter duplo (σ) vel $2\frac{1}{4}$ — $2\frac{1}{3}$ (φ) latiore, utrinque guttula ferruginea obsolete notato; antennis articulo secundo margini basali pronoti longitudine subaequali (φ brach.) vel huic parum (σ) vel distincte (φ macr.) breviore, a basi gracili versus apicem distinctius incrassato (φ), maris minus tenui, articulis ultimis simul secundo vix (σ) vel paullulum longioribus. Long. σ $4\frac{3}{4}$, φ macr. 4 — $4\frac{3}{4}$, φ brach. 3 — $3\frac{1}{2}$ mm.

Hab. in Asia minore (Smyrna!, D. Dr KRUEPER; Brussa!, D. MERKL.).

Descr.: Mas *O. saltatori* HAHN similis, sed minor, antennis articulis duobus ultimis simul secundo vix longioribus distinctus. Femina ab *O. saltatore* HAHN corpore minore, articulo secundo antennarum multo tenuiore, oculis minus convexis et exsertis hemielytrisque formae brach. apice versus suturam multo fortius obliquatis, appendice membranacea multo angustiore instructis certe distincta, etiam ab *O. tenuicorne* M. et R. statura minore, oculis minoribus, minus convexis et exsertis, antennis adhuc gracilioribus sed apicem versus distinctius incrassatis, articulo primo nigro divergens; ab *O. bilineato* JAK. et *bivittato* FIEB. vertice multo angustiore mox distingvenda. Corpus oblongum, parallelum (σ) vel oblongo-ovale (φ macr.) vel ovatum (φ brach.), nigrum, nitidulum, supra nigro-pilosum, pilis squamiformibus albis faciliter divellendis vestitum. Caput basi