

pone callos nec non scutello macula media basali aurantiacis; pronoto postice lateribusque usque ad apicem grisescente, ante marginem posticum maculis quatuor anguste confluentibus nigris, ipso margine albedo; scutello apicem versus leviter virescenti-pallido; hemielytris vena clavi, corio juxta suturam clavi margineque exteriore nigro-conspersis, cuneo dense minutissime nigricanti-consperso, apice late punctoque in terlia basali parte suturæ membranæ nigris, extremo apice pallido; corio nitidulo, angulo interiore macula opaca sordide virescente postice infuscata; membrana pallida, griseo-irrorata, venis omnibus pallidis; antennis albidis, articulo primo tenui, pronoti longitudine, sanguineo-fusco-consperso, secundo toto pallido, longissimo, primo duplo et dimidio longiore, ultimis nigris, tertio basi albo; rostro medium ventris sat longe superante, albedo, apice nigro; pedibus albicantibus, femoribus apice nigro-conspersis, tibiis saltem anticis (postici desunt) breviter pallido-spinulosis, margine antico usque ad partem quartam apicalem nigris; orificiis metastelthii virescentibus; capite fortiter nutante, clypeo a fronte leviter discreto, angulo fasciali acuto, vertice feminae oculo vix latiore. — ♀. Long. $\bar{3}\frac{3}{4}$ mill. — Caracas.

Signatura tiliarum P. tibiali Reut. ex America boreali affinis, mox tamen notis supra datis distinguendus.

13. **Phytocoris tripunctatus**, n. sp. — Pallide sordide flavens, sat nitidus, superne pallido-pubescentis; capite linea longitudinali medio usque ad basin clypei ducta colloque guttis duabus aurantiacis; capite lateribus vittis duabus ante-ocularibus, pronoto macula utrinque ad annulum apicalem maculaque paullo majore rotundata media mox pone callos, epimeris prothoracis vittis duabus longitudinalibus, metastethio lateribus nigris vel nigro-rufis; scutello angulis basalibus vittisque duabus mediis nigro-fuscis vel fuscis; clavo corioque interne magis minusve fusco-conspurcatis, cuneo apice concolori vel fusciscente; membrana sordide fusciscenti-conspurcata, venis sordidis vel rufescentibus; antennis fuscis paullo magis robustis (♂) vel pallidis, gracilioribus, articulo secundo apice nigro (ultimi desunt), articulo primo setis rigidis destituto, pronoto et dimidio oculi a supero visis æque longo (♂) vel pronoto parum longiore (♀), secundo primo circiter duplo et dimidio longiore; rostro pallido, medium ventris sat superante, apice nigro; pedibus pallide flaventibus, femoribus posticis versus apicem sordide fusciscentinebulosis, tibiis omnibus innolatis, testaceo-spinulosis, tarsis apice leviter infuscatis; pronoto subruguloso-punctulato; capite verticali, fronte apice sat convexa, clypeo ante apicem distincte depresso, angulo