

14. **C. strigifrons**, n. sp. — *Testacea vel flavo-ferruginea, superne fortius sat longe aureo-pubescent, pronoti lateribus magis exserte pilosis; antennis articulo secundo versus apicem ultimisque nigris, tertio basi et apice angustissime albido, secundo latitudine basali pronoti paullo breviore, tertio secundo duplo breviore, quarto tertio fere 1/3 breviore; pronoto basi longitudine vix duplo latiore.* — Long. 5 1/2 mill. — Colonia Tovar.

Divisio **DICYPHARIA** Reut.

15. **ANNONA BIMACULATA** Dist., Biol. Centr.-Amer., p. 290, tab. xxvii, fig. 25 (*Ania*), p. 297.

Varietas pronoto maculis disci postici destituto. — Caracas.

Genus divisionis Dicypharia nec Phytocoraria !. Oculis pronoto contiguis, articulo primo antennarum longo, tenui, sutura clavi suturaque embolii explanati interiore transversim dense carinulatis articuloque secundo tarsorum posticorum tertio parum longiore insigne.

Divisio **CYLLOCORARIA** Reut.

Schizonotus, nov. gen.

Corpus angustum, laxe, nitidum, medio constrictum; capite magno, fere semigloboso, fortiter nutante, ab antico viso basi pronoti paullulum angustiore, late breviterque ovato, vertice supra oculos elevato, margine arcuato retrorsum supra annulum apicalem pronoti producto, fronte convexa cum vertice et clypeo in arcum communem confluente, clypeo sat lato, toto depresso, basi in linea inter scrobes antennarum ducta posita; capite a latere viso altitudine multo breviore, loris discretis angustis versus scrobes antennarum vergentibus, angulo faciali acutiusculo, bucculis linearibus, genis sat humilibus, gula obliqua dimidium capitidis occupante; oculis ne minime quidem prominulis, sublxxvibus, in genas sat longe extensis, orbita interiore infra medium subsinuatis versus apicem vix divergentibus, orbita posteriore late sinuatis; rostro medium mesosterni attingente, gracili, articulo primo bucculas haud superante, secundo et tertio æque longis, quarto tertio longiore; antennis paullo supra apicem oculorum interne insertis, articulo primo brevi, apicem clypei haud attingente, secundo latitudini verticis longitudine æquali, versus apicem leviter incrassato, duobus ultimis crassis, quarto fusiformi; pronoto latitudine postica parum breviore, ante medium valde constricto et sulco transversali profundo latera superante instructo, parte