

antica a medio versus apicem dilatata lateribus rectis, apice tuberculis tribus conicis, medio lateralique utrinque, instructa, tuberculo medio antrorsum, lateralibus antrorsum et extrorsum vergentibus; parte pronoti postica versus basin fortiter dilatata, lateribus rectis, inter angulos basales strictura media magis quam triplo latiore, disco a strictura versus basin in gibbam altissimam transversim compressam margine supero late arcuatam surgente, hac gibba medio subimpressa, postice perpendiculariter vel fere antrorsum nutante; scutello parvulo; hemielytris paullo ante medium corii parallelis, embolio dein subito usque ad apicem fortiter dilatato-rotundato, cuneo brevi, embolio fere toto cuneoque externe versus latera deflexis, membrana biareolata; rima orificiorum metastethii subtili, transversa; abdomine dilatato, terebra feminae longa; tibiis anticis submuticis (pedes postici desunt).

Genus structura antennarum, pronoti et hemielytrorum valde insigne; structura capitis et rostri articuloque primo antennarum brevi Globicepi sphegiformi Rossi affinis.

16. **S. dromedarius**, n. sp. — *Superne fulvus vel ferrugineus, inferne cum femoribus in sordide coccineum vergens, parce tenuissime pallido-pubescent, antennarum articulo primo apiceque secundi nec non coxis posterioribus albidis; antennis articulo primo basi et vitta superiore secundoque, apice excepto, fuscis, ultimis nigris, tertio secundo fere $1\frac{1}{4}$ brevior, quarto tertio æque longo; tibiis tarsisque fuscis, his dimidio basali albidis; hemielytris fulvis vel cinnamomeis, basi clavi fuscique ante medium corii dense niveo-squamosis, corio pone hanc fasciam, cuneo membranaque nigro-piceis, embolio fulvo, apice rufo-piceo. — ♀. Long. $2\frac{1}{2}$ mill. — Caracas.*

