

# Capsidae novae mediterraneae

descriptae

ab

O. M. Reuter.

I.

## 1. Tuponia Montandoni Reut.

*Diagn.:* Pallide ochracea vel albido-ochracea, subtiliter pallido-pubescent, hemelytris unicoloribus etiam pilis adpressis nigris, solum commissura angustissime fusca; membrana nigricante, vena brachiali ochracea, venis cubitali et connectente albidis, areola majore pallide ochracea, apice ejus areolaque minore nigricantibus, macula triangulari albida inter apicem hujus et apicem cunei; tibiis nigrospinulosis; tarsis articulo ultimo dimidio apicali unguiculisque nigris; abdomine virescente. Long.  $3\frac{1}{4}$  mm.

*Hab.* in Romania (Plainesci!), D. Montandon.

*Descr.:* A *T. pallida* Reut., cui colore hemelytrisque innotatis sat similis, tibiis nigro-spinulosis membranaque nigricante mox distincta. Caput ( $\Omega$ ) ochraceum, apice pronoti paullulum latius, basi pronoti fere solum  $\frac{1}{4}$  angustius, ab antico visum latitudine frontis oculique unici fere brevius, a latere visum altitudine multo brevius, gula brevisima; vertice oculo circiter  $2\frac{1}{2}$  latiore. Rostrum apicem coxarum posticarum vix superans, articulo ultimo ad maximam partem nigro. Antennae ad sinum oculorum inferne insertae, articulo secundo latitudine basali pronoti parum breviore. Pronotum capite pallidius, basi longitudine duplo