

a genere *Psallus* Fieb., Reut. verticis margine tenuissime incrassato, oculis laevibus, articulo primo rostri brevior, pronoto apice medio fortius sinuato, tarsis brevioribus divergens. Caput basi pronoti circiter $\frac{2}{5}$ (σ) vel fere duplo (φ) angustius, a latere visum altitudini aequae longum, fronte leviter convexa. Oculi in genas longe extensi, maris majores et fortius prominentes, feminae levius prominentes, orbita interiore versus apicem sinuati. Antennae articulo primo apicem clypei parum superante, articulo secundo maris paullo crassiore, sublineari, feminae graciliore, versus apicem sensim levissime incrassato. Pronotum transversum, lateribus reclinatis, basi truncata, disco versus apicem sat declivi, callis discretis. Scutellum basi detectum. Hemelytra lateribus maris parallela, feminae levissime rotundata. Alarum aleola hamo ab origine venae decurrentis sat longe remota. Femora postica elongata, feminae vix crassiora, apice superne punctis 2–3 setiferis instructa.

Orthopidea fusciceps Reut.

Diagn.: Pallide flavo-testacea, nitida, superne parce tenuiter flavicanti-pubescentis; capite picco, margine verticis pallide flavo, interdum (φ) fronte medio lateribusque testaceis; scutello subsulphureo, basi detecta picea, hemielytris limbo scutellari latius, commissura angustius, apice cunei sat late venisque membranae piceis, vena brachiali basin versus pallida, corio plaga apicali subtriangulari fusciscente; membrana dilute fumata; antennis obscurius lurido-testaceis (σ) vel pallide flaventibus (φ); pedibus pallide flaventibus, anticis totis innotatis, femoribus posterioribus subseriatim nigro-punctatis, tibiis spinulis nigris e punctis nigris nascentibus, tarsis articulo ultimo apice fusco. Long. 3 mm.

Var. β : Superne rufo-testacea, clypeo apice nigro-picco, margine verticis scutelloque flavis, pronoto antice, callis exceptis, cuneoque pallide testaceo-flavis, hoc apice limboque interiore nec non venis membranae rubris.