

*Hab.* in Algeria (Sidi bou Zid!, Chellola!, Charef!), D. de Vauloger, *Var. β* in Saida!, D. Dr Chobaut.

*Deser.:* Caput vertice oculo circiter  $\frac{2}{5}$  ( $\sigma^{\circ}$ ) latiore. Oculi fusco-castanei. Rostrum pallide flavens, ipso apice piceo. Antennae articulo secundo latitudine basali pronoti circiter  $\frac{1}{6}$  ( $\sigma^{\circ}$ ) vel fere  $\frac{3}{5}$  ( $\varphi$ ) breviore, ultimis simul summis secundo brevioribus, tertio secundo fere duplo ( $\varphi$ ) breviore. Pronotum basi longitudine circiter duplo latiore, apice longitudine distinete angustiore. Femora posteriora superne parum punctata, inferne praecipue marginibus punctis nigris vel nigro-fuscis signata, etiam disco apicem versus atomis nonnullis fuscis adspersa.

### 8. *Plagiognathus fulvipennis* Kirschb. var. *diversicornis* Reut.

Antennis ochraceis, articulo primo basi nigro, annulo apicali fuso, secundo basi anguste nigra. Moldavia, D. A. L. Montandon.

### 9. *Atractotomus brevicornis* Reut.

*Diagn.:* Ovalis, niger, squamis argenteis vestitus, superne nigro-pubescent; antennis articulis duobus primis nigris, secundo feminae sat fortiter fusiformi, basin quam apicem versus multo longius attenuato, brevi, latitudine capitis parum longiore, ultimis pallide flavis; hemelytris unicoloribus, incisura fracturae cunei parum profunda, membrana nigricante, venis fuscis, vena connectente fusco-testacea, macula ad apicem cunei hyalina; pedibus sordide picescenti-albidis, femoribus apice excepto nigris, tibiis nigro-spinulosis, tarsis articulo ultimo nigro-fusco. Long. ♀  $2\frac{1}{4}$  mm.

*Hab.* in Algeria (Oran, Djebel Tessalah!), D. Dr Schmiedeknecht, comm. D. Dr Fokker.

*Deser.:* Ab *A. magnicorni* Fall., cui magnitudine subaequalis, colore venarum membranae et praecipue brevitate