

tis nigris; oculis brevius pedunculatis, pedunculo recte extorsum et levissime sursum vergente; antennis articulo primo margine apicali pronoti circiter $\frac{1}{3}$ et articulo secundo circiter $\frac{3}{5}$ breviore, apicem clypei haud superante; clypeo basi supra medium capitis posito. Long. formae macr. ♂ 4, ♀ 5, f. brach. ♀ $3\frac{1}{3}$ mm.

Hab. in Dauria (Irkut!), D. Leder (mus. Vindob.).

Deser.: A speciebus reliquis pedibus totis nigris mox distinctus. Caput cum oculis basi pronoti distincte latius (♀ brachypt.) vel hac paullo angustius (macropt.), vittis verticis transversalibus versus oculos dilatatis, margine inferiore styli oculorum brevissimo. Oculi obscure fusci. Rostrum piceo-nigrum. Antennae nigrae, articulo primo setis rigidis sat tenuibus. Pronotum margine laterali apicali circiter $\frac{1}{4}$ breviore (f. brach.) vel huic aequelongo (f. macr.), basi apice circiter dimidio (f. macr.) vel $\frac{2}{5}$ (f. brach.) lato, disco postico transversim strigoso, basi leviter sinuato, lateribus levissime sinuatis, versus apicem longius pallido-setosus. Hemielytra explicata, membrana abdomen $\frac{2}{5}$ (♂) vel $\frac{1}{2}$ (♀) longitudinis superante, nigro-fusca, vel abbreviata, basin segmenti sexti dorsalis vix attingentia, membrana nulla, cuneo apice late rotundato, basi incisura externa discreto. Connexivum margine laterali apicem versus albido.

11. *Halticidea* Reut.

Diagn.: Corpus breve, formae brachypterae late obovatum, convexum; capite verticali, ab antico viso pentagonalii, a latere viso altitudine magis quam duplo breviore, vertice lato, margine acuto subrecto, fronte valde convexa, loris parum compressis, genis altissimis; oculis brevibus, valde prominentibus, sat compressis, retrorsum vergentibus, angulis pronoti incumbentibus, tertiam partem basalem capitis haud superantibus; rostro brevi, crasso; antennis gracilibus, sat longe infra apicem oculorum insertis, articulo primo medium clypei paullo superante, secundo latitudine