

*Descr.:* Caput (♀ brachypterae) basi pronoti aequa latum, vertice oculo lato parum magis quam duplo latiore. Antennae articulo tertio secundo circiter duplo et quarto fere  $\frac{1}{3}$  breviore, nigrae, articulo primo ipso apice secundaque sordide testaceis, hoc basi nigro-fusco. Pronotum (f. brachypt.) basi longitudine circiter duplo latius, apice ante callos coriaceo subtiliter ruguloso, disco postico confertim subtiliter punctato. Hemielytra f. brachypt. segmentum quartum dorsale attingentia, apice versus suturam oblique subsinuato-truncata. Femora anteriora margine antico apice setis 1—2 rigidis, postica valde dilatata, latitudine circiter solum triplo longiora, margine antico setis rigidis 4—5, nigra, apice anguste flavo-testaceo. Tibiae flavo-testaceae, pallido-pubescentes, nigro-spinulosae, posticæ spinulis e punctis minutis fuscis. Tarsi nigri.

## 12. *Myrmecophyes tibialis* Reut.

*Diagn.:* Niger, nitidus, antennis pedibusque nigris, margine superiore femorum anteriorum vel anticorum margine que exteriore tibiarum anteriorum vel omnium albido-flaventibus, articulo primo maris gracili, linearis, solum interne setis paucis nigris rigidis, latitudini capitis cum oculis fere aequa longo; oculis sessilibus, exsertis; hemielytris formae brachypterae apice albis, late truncatis et angulo exteriore late rotundatis. Long. ♂ brachypt. 3 mm.

*Hab.* in montibus Turkestaniae prope Dschilarik!, d. 18 julii, D. Prof. J. Sahlberg.

*Descr.:* *M. nigripedi* Reut. similis et affinis, colore pedum anteriorum structuraque antennarum divergens. Corpus nigrum, nitidum, laeve, glabrum. Caput basi pronoti formae brachypterae (♂) latitudine oculi unici latius, vertice plano oculo circiter  $\frac{3}{4}$  latiore. Oculi fusi. Rostrum nigrum, apicem coxarum posticarum subattingens. Antennae (♂) nigrae, articulo primo basi levissime curvato, gracili, interne parce rigido-setoso, externe glabro, secundo