

Hab. in Turkestan (Dschilarik! d. 23 julii), D. Prof. J. Sahlberg.

Deser.: Forsitan mas *Gl. fulvicollis* Jak., sed corio albo nec fulvo. Caput (σ^{\prime}) verticale, basi pronoti $\frac{1}{4}$ angustius, vertice oculo fere $\frac{3}{4}$ latiore, fronte perpendiculari. Rostrum coxas intermedias attingens, fulvum, articulo primo piceo, medium xyphi attingente. Antennae (σ^{\prime}) articulo secundo toto nigro, latitudine capitis paullo magis quam duplo latiore, versus apicem sensim incrassato, duobus ultimis obscure fulvis. Pronotum basi quam ipso apice ante callos fere duplo et dimidio latiore, callis parum convexis, tateribus late sinuatis. Membrana nigricans, macula inter apicem cunei apicemque areolae minoris hyalinescente. Metastethium orificiis nigris. Coxae nigro-piceae, apice pallide flavente. Tibiae tenuiter testaceo-spinulosae. Forceps maris dextra lobo dextro paullo altiore, sinistro magis oblique producto subparallelo.

15. *Atomophora vitticollis* Reut.

Diagn.: Oblongus, capite cuneoque flavo-ferrugineo-signatis; pronoto, scutello, clavo et corio punctis nigro-fuscis adspersis, pronoto utrinque vitta obliqua percurrente, antice leviter excurvata, scutello angulis basalibus, clavo macula oblonga media, corio macula triramosa apicali nigris; membrana cum areolis dense fusco-cinereo-irrorata, venis albis, limbo exteriore albo, maculis duabus, altera basali altera apicali, nigris; antennis albido-virentibus, articulo primo puncto interiore subapicali sat magno nigro; femoribus punctis nigro-fuscis parcis adspersis, ante apicem superne et interne annulis vel maculis majoribus transversis nigris, tibiis spinulis albis e punctis nigro-fuscis nascentibus; ventre virescente, utrinque vitta laterali sanguinea. Long. ♂ $3\frac{3}{5}$ mm.

Hab. in *Salsolaceis*: Turcomannia (Repetek! d. 17 aug.), D. Prof. J. Sahlberg.