

tibiis spinulis albidis e punctis nigro-fuscis nascentibus; tarsis posticis longiusculis, articulo ultimo secundo aequo longo; unguiculis leviter curvatis, aroliis distinctis cum iis totis connexis eorumque medium vix excedentibus.

*Habitat* species unica hactenus cognita in parte africana territorii mediterranei.

*Deser.:* Primo intuitu speciebus quibusdam generis *Psallus* Fieb., Reut. similis, capite autem a latere viso multo breviore, verticali, vertice tenuiter marginato, fronte clypeo-que verticalibus, hoc ab antico viso latiore, a latere viso parum prominente, femoribus posticis margine anteriore setis pluribus rigidis instructis divergens; a gen. *Moissonia* Reut., cui forsitan affinis, vertice distincte marginato, clypeo basi altius posito, antennis longioribus, rostro coxas posticas paullo superante, coxis anticis longioribus, tibiis albo-spinosis, unguiculis longioribus sensim leviter curvatis, aroliis cum unguiculis totis connexis.

### Psallopssis femoralis Reut.

*Diagn.:* Inferne dilute virescens, superne albido-virens, capite saepe nonnihil in ochraceum vergente, albido-pubescentia, hemielytris albidis, ubique punctis griseo-fuscis sat dense conspersis, membrana alba, griseo-fusco-irrorata, venis albidis, areolis punctis griseo-fuscis notatis; antennis articulo primo apice excepto femoribusque obscure fuscis, tibiis tarsisque albidis, illis spinulis albidis e punctis sat minutis fuscis nascentibus. Long. ♀ fere 3 mm.

*Hab.* in Algeria (Biskra! d. 20 maj), D. Prof. J. Sahlberg.

*Deser.:* Caput (♀) basi pronoti circiter  $\frac{1}{4}$  brevius, a supero visum pronoto aequo longum, ab antico visum latitudini frontis oculique unici longitudine subaequale, a latere visum altitudine basali circiter  $\frac{1}{3}$  brevius; vertice oculo fere duplo et  $\frac{2}{3}$  latiore. Oculi fusti. Antennae articulo primo excepto virescenti-albidae, articulo secundo margine basali pronoti vix breviore, tertio secundo circiter  $\frac{1}{4}$ , quarto ter-