

38. *Fulvius albifrons* Reut. aus Sydarabien (Aden) und *F. clavicornis* Reut. aus Australien (Victoria), in meiner Abhandlung „Zur Kenntn. d. Capsideng. Fulvius“ (Ent. Tidskr. 1895, 151, 14 und 152, 15) beschrieben, sind je als der Typus einer eigenen Gattung zu betrachten. Diese Gattungen lassen sich folgendermassen kurz characterisiren:

Rhinofulvius nov. gen.

A *Fulvio* Stål capite adhuc longius producto, oculis haud in gulam extensis, genis distinctis, antennis longius ante marginem oculorum insertis, articulo primo apicem capitidis vix superante, articulo primo rostri medium oculorum vix attingente, hemielytris formae brachypterae cuneo et membrana nullis divergens.

Typus: *Fulvius albifrons* Reut.

Ceratofulvius nov. gen.:

A *Fulvio* Stål capite longius producto, oculis haud usque ad gulam extensis, genis distinctis, antennis longius ante marginem oculorum insertis, a *Rhinofulvio* articulo antennarum primo apicem clypei paullo superante, secundo apicem versus in clavam elongato-fusiformem incrassato, articulo primo rostri capitidis longitudine, callis pronoti alte elevatis, etc. divergens.

Typus: *Fulvius clavicornis* Reut.

39. Herr Dr G. Breddin hat mir zur Bestimmung zwei Capsiden gesandt, die angeblich in Brasilien in Orchideen leben. Sie gehören den Gattungen *Fulvius* Stål und *Eccritotarsus* Stål an und scheinen mir beide bisher unbeschrieben zu sein. Ich lasse hier die Beschreibungen folgen.

***Fulvius Breddini* n. sp.**

Oblongus, nigricanti-fuliginosus, opaculus; hemielytris, coxis femoribusque (postica desunt) sat obscure fuliginosis, clavo cuneoque nigrofuliginosis, illo apice anguste palli-