

diore, corio fere in tertia basali parte fascia medium clavi attingente cuneoque parte basali, angulo interiore excepto, albis; femoribus apice, tibiis tarsisque pallidioribus, testaceofuliginosis. Long. ♀ $4\frac{2}{3}$ mm.

Hab. ad radices Orchidearum in Brasilia (San Francesco!).

Antennae speciminis unici desunt. A *F. quadristylato* Stål et *bisbistillato* Stål corpore sat multo majore, colore pedum mox distinguendus. Caput pronoto aequem longum, subporrectum, superne versus apicem sensim declive, ab antico visum latitudini (cum oculis) longitudine aeqvale, a latere visum altitudine basali paullo longius, vertice sulco longitudinali distincto, genis haud distinguendis, angulo faciali acuto. Oculi fortiter granulati, in gulam longe extensi. Antennae ad medium marginis interioris oculorum insertae. Pronotum latitudine basali circiter $\frac{1}{4}$ brevius, apice quam basi paullo magis quam duplo angustius, striatura apicali optime discreta, callis magnis sat alte convexis, sulco medio disjunctis, lateribus versus basin late sinuatis, angulis basalibus extrorsum et retrosum in lobum obtuse rotundatum productis. Hemelytra subparallelia, abdomen sat longe superantia (♀), fascia corii parte fusca basali angustiore, fascia cunei interne latiore; membrana obscure fusca. Pectus et venter tota nigro-fusca.

Eccritotarsus orchidearum n. sp.

Rufescenti-luteus, superne dense breviter lutescenti-pilosulus; antennis, oculis apiceque tibiarum nigris; scutelli parte apicali, guttula utrinque basali excepta, hemielytrisque pulchre coeruleo- vel aeneo-nigris, splendentibus, his basi clavi anguste limboque lato corii et cunei rubris; membrana nigricante, versus apicem decolore. Long. ♀ $4\frac{1}{2}$ —5 mm.

Hab. in Orchideis in Brasilia (Porto Alegre!), comm. D. Dr Breddin; Sta Catherina, D. Linden, comm. D. Dr E. Bergroth.