

A *C. pinastri* Fall. statura minore et distinctissimæ angustiore, pronoto breviore, minus convexo et densius punctato, scutello subhorizontali, sat fortiter transversim strigoso, hemielytris pubescentia aurea praecipue in clavo distinctissima praeditis, pilositate semierecta grisea subdestitutis, capite, antennis pedibusque obscurioribus certe distinctum videtur. Caput basi pronoti vix $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ angustius. Rostrum piceum, apicem coxarum posticarum sat longe superans (♀) vel medium ventris attingens (♂). Antennae articulo secundo primo paullo magis quam triplo longiore et margini basali pronoti longitudine aequali vel subaequali, duobus ultimis simul sumtis secundo aequve longis vel hoc paullo brevioribus. Pronotum latitudine basali duplo vel $\frac{3}{8}$ brevius, apice longitudini latitudine subaequali. Hemielytra abdomen modice (♂) vel breviter (♀) superantia. Tibiae tenuiter nigro-spi-nulosae. Tarsi apice nigri.

54. Dr Handlirsch hat mir u. A. einen ganz schwarzen, nur mit weissen Schienenringeln gezeichneten *Deraeocoris* aus Dalmatien gesandt. Die lange Behaarung, die langhaarigen Fühler, die ganz rauchbraune Membran, wie auch die schwarzbraunen Stinkfelder der Hinterbrust beweisen, dass dieses Stück nur eine extreme Varietät von *D. schach* F. ist, bei welcher der Melanismus auch den Kopf umfasst, was noch nicht bei der Var. *Novaki* Horv. der Fall ist. Ich nenne diese Var.:

Deraeocoris schach, var. **nigrita** m.: Ut var. *Novaki*, sed capite nigro-piceo, solum fronte medio obsolete pallidente, antennarum articulo tertio toto nigro. ♂.

Eine in entgegengesetzter Richtung extreme Varietät ist die folgende, von welcher ich zwei Exemplare aus Italien (Costa, in Mus. Paris.) gesehen habe:

Var. **rutiloides** m.: Scutello, clavo apice, corio cuneoque rubris, corio solum ipso angulo exteriore apicali striaque interiore apicali vel fascia angusta apicali continua nec non cuneo apice nigris.