

16. Aeolocoris n. gen.

Corpus oblongum, opacum, superne cum hemielytris dense albo- et fusco-conspersum; capite parvulo, verticali, ab antico viso pentagonali, leviter transverso, a latere viso altitudine parum breviore, vertice horizontali, immarginato, fronte basi levissime declivi, apicem versus subito verticali, clypeo prominente, verticali, basi leviter arcuato, apicem versus verticali, basi a fronte linea impressa bene discreta, ipsa basi paullo infra lineam intermedium oculorum posita, angulo faciali recto, genis sat humilibus (φ), gula brevi, horizontali; oculis haud divergentibus, setulis albis fragillimis ornatis, orbita interiore media late sinuatis rostro coxas posticas paullo superante, articulo primo medium xyphi prosterni sub-attin gente, antennis longis, mox infra medium oculorum interne insertis, articulo primo incrassato, secundo longo, linearis, ultimis secundo aequae crassis; pronoto leviter transverso, apicem versus sat fortiter declivi, strictura apicali sat lata, callis magnis, sat convexis, medio sat late distantibus, lateribus sinuatis, margine basali lateribus rotundato, medio late sinuato; scutelli parte apicali disco convexa; hemielytris parallelis; femoribus elongatis, tibiis breviter spinulosis, tarsis posticis articulo primo brevi, ultimo duobus primis simul sumtis fere aequae longo, ungaviculis sat leviter arcuatis, basi leviter ampliatis, aroliis tenuissimis, pilaeformibus.

Generi *Acrorrhino* Noualh. affinis, structura capitis et antennarum mox distingvendus. Caput loris optime discretis. Oculi a supero visi globosi. Xyphus prosterni triangularis, planiusculus, marginibus leviter reflexis. Coxae anticae medium mesosterni longe superantes, posticae ab epipleuris hemielytrorum parum remotis. Terebra feminae medium ventris distincte superans.

Aeolocoris alboconspersus n. sp.

Tab. I, fig. 5.

Superne grisescenti-fuscus, capite pronoto et scutello guttulis vel fere granulis parvis albis adspersis, hemielytris