

6. Deraeocoris rutilus (H. S.)

Var. fasciata n.: hemielytris coccineis, clavo extremo apice nigro, corio macula majore ad angulum interiorem subtriangulari aliaque minore exteriore paullo supra apicem oblique posita subquadrata, his maculis confluentibus et fasciam antepicalem leviter obliquam dentatam formantibus, nec non $\frac{2}{5}$ apicalibus cunei nigris. ♀.

Cyprus (Larnaca!), D. E. Deschamps (Mus. Bruxell.).

Haec varietas transitum format inter varietates *typicam* et *bellicosam* Horv.

7. Deraeocoris scutellaris (F.).

Var. ventralis n.: Superne cum scutello nigra, inferne nigra, orificiis metastethii albis, ventre lateribus late rubris; pedibus rubris, coxis anticis nigro-maculatis, coxis posticis, basi femorum, apice tibiarum tarsisque nigris. ♀.

Croatia! (Mus. Vindob.).

8. Anapus flavidornis Jak. n. sp. in litt.

Niger, opacus, pilis albis faciliter divellendis vestitus; antennis articulo primo valde incrassato, obconico, sat dense spinoso, latitudine interoculari verticis fere $\frac{1}{4}$ (♀) breviore, secundo primo saltem duplo longiore et latitudine capitis cum oculis sublongiore, toto flavo-ferrugineo; apice extremo femorum anticorum tibiisque anticis basin versus flavo-ferrugineis, tibiis posterioribus, margine inferiore apiceque exceptis, flavo-ferrugineis, spinulis nigris e punctis nigris nascentibus; vertice plano, oculo quadruplo latiore, marginibus orbitalibus anguste testaceis; dorso abdominis utrinque vitta angusta intra-lateralis flavo-ferruginea; oculis sessilibus; pronoto postice distincte transversim rugoso; hemielytris formae brachypterae apice fere recte truncatis, margine apicali utriusque commissura paullo magis quam $\frac{1}{4}$ breviore; femoribus posticis valde